



MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG XXX. KONGRESSZUSA

SZEGED, 2022. SZEPTEMBER 8–11.



PROGRAM



Folyamatos Cukormonitorozási Rendszer (CGM)



14 napos
szenzor élettartam



1 percenként
mért új adat



személyre szabható
figyelmeztetések



fájdalommentes
szenzorhelyezés



valós idejű
adattovábbítás



környezetbarát

**Megvásárolható szaküzletünkben
és webáruházunkban:**

77 ELEKTRONIKA KFT.

/ H-1116 Budapest, Fehérvári út 98.
/ CGMS ZÖLDSZÁM: + 36/80 88 00 77
/ e-mail: cgms@e77.hu
/ web: www.cgms.hu



77 ELEKTRONIKA KFT.



A termék gyógyászati segédeszköz.
Lezárás dátuma: 2022.07.27.



SIKERÉLMÉNY¹⁻⁴

A jó anyagcsere kontroll növeli a felnőtt T2DM betegek magabiztosságát, ami sikerélményhez vezet. ^{1,3}
A Xultophy® terápia segíthet a glikémiás kontroll elérésében.

6x több beteg éri el a 7% alatti HbA_{1c}-értéket Xultophy® mellett testsúlynövekedés és hipoglikémia nélkül vs. BBT*

Xultophy®
degludek inzulin / liraglutid injekció

T2DM-ben gondoljon a Xultophy® kezelésre a BBT alternatívájaként!⁵

*vizsgálat utolsó 12 hete: OR; 10,39 95%-os CI [5,76;18,75], p<0,0001, teljes vizsgálati időszak: OR; 12,56 95%-os CI [6,46;24,45], p<0,0001

Fázis III. vizsgálat, kompozit végpont, Xultophy (n=252) vs. glargin 100 E/ml + aszpart inzulin (n=254)⁴

Rövidítés magyarázat: BBT: bázis-bólus terápia, T2DM: 2-es típusú cukorbetegség, OR: Esélyhányados

A képen nem valódi beteg, hanem modell szerepel.

Referencia: 1. Polonsky W *et al.* *J Diabetes Complications*. 2015;29(8):1171–6. 2. Celano C *et al.* *Curr Diab Rep*. 2013;13(6):917–929. 3. Moore Beckerle C and Lavin MA. *Diabetes Spectrum*. 2013;26(3):172–178. 4. Billings L *et al.* *Diabetes Care*. 2018;41(5):1009–1016.

5. Egészségügyi szakmai irányelv – A diabetes mellitus kórismézéséről, a cukorbeteg antihyperglykaemiás kezeléséről és gondozásáról felnőttkorban. *Diabetologia Hungarica* 2020; 28(3):119-204. DOI: 10.24121/dh.2020.14

A GYÓGYSZER NEVE: Xultophy® 100 egység/ml + 3,6 mg/ml oldatos injekció.
MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: 1 ml oldat tartalma 100 egység degludek inzulin* és 3,6 mg liraglutid*.

*Rekombináns DNS technológiával *Saccharomyces cerevisiae*-ben állítják elő. 3 ml-t tartalmaz előretöltött injekciós tollanként, amely megfelel 300 egység degludek inzulinnak és 10,8 mg liraglutidnak.

Egy adagolási egység tartalma 1 egység degludek inzulin és 0,036 mg liraglutid.

GYÓGYSZERFORMA: Oldatos injekció. Tiszta, színtelen, izotóniás oldat.

A készítmény rendelése előtt kérjük, olvassa el a hatályos teljes alkalmazási előírást!

A hatályos alkalmazási előírás teljes szövege megtalálható az Európai Gyógyszerügynökség honlapján:

<https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Xultophy#product-information-section>

Megjegyzés: A QR kód a készítmény oldalára mutat. A magyar nyelvű alkalmazási előírás ezen az oldalon a Product information szakasz első lenyíló listájában (Available languages), a Hungarian szóra kattintva érhető el.



Feltételezett mellékhatások bejelentése: A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest; honlap: www.ogyei.gov.hu.

TÁMOGATÁSSAL ÉS ÁRRAL, VALAMINT A RENDELHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ: A Xultophy® 100 egység/ml + 3,6 mg/ml oldatos injekció osztályozási besorolása: „J” szakorvosi/kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban alkalmazható gyógyszer. Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

A Xultophy® 100 egység/ml + 3,6 mg/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban (3x3ml) gyógyszerkészítmény bruttó fogyasztói ára: 40 315 Ft, tb-támogatás: 28 221 Ft, térítési díj: 12 094 Ft EU. 70 1. pont szerinti rendelés esetén.

Az anyag lezárásakor hatályos NEAK Publikus Gyógyszentörzs alapján. A Xultophy® a Novo Nordisk A/S, Dánia védjegye.

© 2022 Novo Nordisk A/S

A HIPOGLIKÉMIA KOCKÁZATÁT CSÖKKENTHETI BETEGEINÉL TRESIBA® KEZELÉssel^{1-10*}



*Felnőtt, 1-es és 2-es típusú cukorbeteg körében.

Referenciák: 1. Tresiba® alkalmazási előírás. 2. Lane WS, Bailey TS, Gerety G, et al. Effect of Insulin Degludec vs Insulin Glargine U100 on Hypoglycemia in Patients with Type 1 Diabetes: The SWITCH 1 Randomized Clinical Trial. JAMA 2017; 318(1):33-44. 3. Workgroup on Hypoglycaemia, American Diabetes Association. Defining and Reporting Hypoglycemia in Diabetes: A Report From the American Diabetes Association Workgroup on Hypoglycemia. Diabetes Care 2005; 28(5):1245-1249. 4. Wysham C, Bhargava A, Chaykin L, et al. Effect of Insulin Degludec vs Insulin Glargine U100 on Hypoglycemia in Patients with Type 2 Diabetes: The SWITCH 2 Randomized Clinical Trial. JAMA 2017; 318(1):45-56. 5. Marso SP et al. N Efficacy and Safety of Degludec versus Glargine in Type 2 Diabetes Engl J Med 2017; 377:723-732. 6. Tibaldi et al. A comparative effectiveness study of degludec and insulin glargine 300 U/mL in insulin-naïve patients with type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2018 Dec 15. doi: 10.1111/dom.13616. 7. Siegmund et al. A European, multicentre, retrospective, non-interventional study (EU-TREAT) of the effectiveness of insulin degludec after switching basal insulin in a population with type 1 or type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab 2018 Mar; 20(3):689-697. 8. Philis-Tsimikas A, Klonoff D.C., Khunti, K. et al. Risk of hypoglycaemia with insulin degludec versus insulin glargine U300 in insulin-treated patients with type 2 diabetes: the randomised, head-to-head CONCLUDE trial. Diabetologia (2020). <https://doi.org/10.1007/s00125-019-05080-9>. 9. Rodbard HW, Cariou B, Zinman B, Handelsman Y, Philis-Tsimikas A, Skjrh TR, Rana A, Mathieu C on behalf of the BEGIN Once Long Trial Investigators. Comparison of insulin degludec with insulin glargine in insulin-naïve subjects with Type 2 diabetes: a 2-year randomized, treat-to-target trial. Diabetic Medicine 2013; 30(11):1298-1304. 10. Gian Paolo Fadini et al. Switching to Degludec From Other Basal Insulins Is Associated With Reduced Hypoglycemia Rates: A Prospective Study. J Clin Endocrinol Metab, December 2019, 104(12):5977-5990

A GYÓGYSZER NEVE: Tresiba® 100 egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban
MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: 300 egység degludec inzulint tartalmaz előretöltött injekciós tollanként, 3 ml oldatban. 1 ml oldat 100 egység degludec inzulint tartalmaz* (egyenértékű 3,66 mg degludec inzulinnal).

*Rekombináns DNS technológiával Saccharomyces cerevisiae-ben állítják elő.

GYÓGYSZERFORMA: Oldatos injekció (FlexTouch®). Tiszta, színtelen, semleges oldat.

A készítmény rendelése előtt kérjük olvassa el a hatályos teljes alkalmazási előírást!

A hatályos alkalmazási előírás teljes szövege megtalálható az Európai Gyógyszerügynökség honlapján: <https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Tresiba#product-information-section>

Megjegyzés: A QR kód és a fenti link a készítmény oldalára mutat. A magyar nyelvű alkalmazási előírás ezen az oldalon a Product information szakasz első lenyitó listájában (Available languages), a Hungarian szóra kattintva érhető el.

Feltételezett mellékhatások bejelentése: A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszközök annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat

profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest; honlap: www.ogyei.gov.hu.

Támogatással és árral, valamint rendelhetőséggel kapcsolatos információk: A Tresiba® 100 egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban osztályozási besorolása: „J” szakorvosi/kórházi diagnózist követő járóbetegellátásban alkalmazható gyógyszer. Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! Tresiba® 100 egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban (5 x 3 ml) bruttó fogyasztói ára: 20 293 Ft, Tb-támogatás: 19 993 Ft, térítési díj: 300 Ft EU100 3. rendelés esetén. Tb-támogatás: 10 147 Ft, térítési díj: 10 146 Ft EU50 6/a, 6/d rendelés esetén. A készítmény 2022. május 1-től hatályos NEAK ár- és támogatási adatai alapján.

Az aktuális árrakkal kapcsolatosan információkat az alábbi linken: www.neak.gov.hu/pupha a következőkre kattintva talál: Végleges törzs/ Publikus gyógyszertervezés – Lakossági tájékoztató A Tresiba® és a FlexTouch® a Novo Nordisk A/S, Dánia védjegye.

© 2022 Novo Nordisk A/S

TELJES ERŐBŐL, ROPPANT EGYSZERŰEN.



Akár **3%**
csökkenés.*³

Komplementer hatásmechanizmus,
teljesebb glikémiás kontroll^{1;2**}

Irodalom: 1. Suliqua Alkalmazási Előírás, 2. Arora VR, Rosenstock J., Wysham C. et al; Diabetes Care 2016. 39 (11). 2026-2035; 3. Davies, Diab Obes Metab 2019 Aug; 21(8): 1967–1972

*A LixiLan -O vizsgálat 9% feletti kiindulási HbA_{1c}-jú alcsoportjának elemzése alapján, n=133 beteg LixiLan-O teljes elemszám n=1164.^{1,3}

** A teljesebb glikémiás kontroll a meghatározás szerint az éhgyomri és posztprandialis glikémia kontrollját együttesen jelenti a szignifikáns HbA_{1c}-csökkentés elérésének érdekében glargin inzulinhoz (100 Egység/ml) hasonlítva; p< 0,0001.

Elérési útvonali:



BŐVEBB INFORMÁCIÓKÉRT KÜSSA EL A GYÓGYSZER ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁSÁT

A hatályos "alkalmazási előírás" teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapokon.

TÁMOGATÁS: EU 70% 1. pont szerinti rendelés esetén: SULIQUA 100 egység/ml + 50 mikrogramm/ml oldatos injekció 5x3 ml előre töltött injekciós tollban gyógyszerkészítmény bruttó fogyasztói ára: 58 091 Ft, tb-támogatás: 39 263 Ft, beteg által fizetendő térítési díj: 18 827 Ft; SULIQUA 100 egység/ml + 33 mikrogramm/ml oldatos injekció 5x3 ml előre töltött injekciós tollban gyógyszerkészítmény bruttó fogyasztói ára: 46 915 Ft, tb-támogatás: 32 841 Ft, beteg által fizetendő térítési díj: 14 075 Ft. Érvényes: 2017. október 1-jétől, www.osp.hu.

Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a HYPERLINK "<http://www.osp.hu>" www.nesak.gov.hu honlapon található információkat.

Elérési útvonali: <http://www.nesak.gov.hu>

Sanofi-aventis Zrt. 1128 Budapest Váci út 133 E épület 3. emelet, Tel.: (+36 1) 505 0050

Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055, www.sanofi.hu

MAT-HU-2100580, Lezárás dátuma: 2022.05.



KIS LÉPÉS AZ ORVOSNAK, NAGY LÉPÉS A BETEGNEK



***Az első 600 mg alfa-liponsavat tartalmazó filmtabletta a diabeteses neuropathia kezelésére Magyarországon,^{1,2} több mint 20 év klinikai tapasztalattal.²**

Készítmény megnevezése	Bruttó fogyasztói ár	Térítési díj normatív támogatás esetén	Emelt támogatási kategória	Emelt támogatás összege	Térítési díj emelt támogatás esetén	KGY keret terhére írható
Thiogamma® oral 600 mg filmtabletta 30x	4 921 Ft	4 921 Ft	EÜ90 2/b: 90%	4 429 Ft	492 Ft	✓
Thiogamma® oral 600 mg filmtabletta 60x	9 382 Ft	9 382 Ft	EÜ90 2/b: 90%	8 444 Ft	938 Ft	✓

¹IQVIA, országos adatok, Sellin Unit, kombinált csatorna

²Thiogamma® oral 600 mg filmtabletta alkalmazási előírás

A forgatomban hozatali engedély első kiadásának dátuma: 1998.10.26.

Thiogamma® oral 600 mg filmtabletta 30x, 60x

Hatóanyag: tioktánsav (alfa-liponsav), ATC kód: A16AX01. **Terápiás javallatok:** Diabeteses neuropathia. **Adagolás és alkalmazás:** Diabeteses polyneuropathia esetén felnőtteknek 1 db filmtabletta Thiogamma® oral 600 mg - ami 600 mg tioktánsavnak felel meg - bevételre ajánlott naponta. Súlyos diabeteses polyneuropathia következményeként kialakult súlyos dysaesthesia esetén a kezelti terápiát tioktánsav parenterális adásával érdemes kezdeni. **Az alkalmazás módja és időtartama:** Száján át történő alkalmazásra. A Thiogamma® oral 600 mg filmtablettát egészben, szétrágás nélkül, elegendő mennyiségű vízzel, éhgyomorra, kb. 30 perccel a napi első étkezés előtt kell bevenni. A tioktánsav a táplálékkal reagál, ezért a jobb felszívódás érdekében a bevétel üres gyomorra javasolt. Mivel a diabeteses polyneuropathia krónikus kimerő betegség, ezért tartós terápia válhat szükségessé. Az egyes esetekben a kezelőorvos dönt. **Ellenjavallatok:** A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** Nagyon ritka: hányinger, hányás, gastrointestinalis fájdalom és diarrhoe, allergiás reakciók, mint bőrpír, urticaria és pruritus, az izézés változása és/vagy zavara. Nem ismert a gyakoriság: inzulin autoimmun szindróma, a glükóz felhasználás javulásának köszönhetően a vércukorszint csökkenhet. Ilyen esetekben hypoglykaemiához hasonló tüneteket figyeltek meg szédüléssel, izzadással, fejfájással, és látászavarokat írtak le. **Felhasználhatósági időtartam:** 3 év. **Kiadhatóság:** Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer IV. Oszályozás: II. csoport. Megjegyzés: 9 (egy keresztes). **A szöveg ellenőrzésének dátuma:** 2021.10.18.

Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását (www.egyet.gov.hu)! Az aktuális árak a www.neak.gov.hu honlapon megtalálhatók.

TH/H/2022-8 Lezárás dátuma: 2022.07.20.

Jardiance®
(empagliflozin)

No.1

Piacvezető gyógyszer család
az originális, nem-inzulin
antidiabetikumok között**

A 2-es típusú cukorbetegség kezelésében*1

ERŐ A GYŐZELEMHEZ*1,2

**SOKOLDALÚ ELŐNYÖK.
BIZONYÍTOTT VÉDELEM.***



Boehringer
Ingelheim

Boehringer Ingelheim RCV
Magyarországi Fióktelepe
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.
Tel.: +36 1 299 8900, Fax: +36 1 299 8901
www.boehringer-ingelheim.hu

Hivatkozások

1. Jardiance alkalmazási előírás: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/jardiance-epar-product-information_hu.pdf

2. Zinman B et al. N Engl J Med 2015;373:2117-28

A gyógyszerek ára, támogatása és rendelkezésére megtalálható a NEAK honlapján:

http://www.oep.hu/felo_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeskoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer részletes alkalmazási előírását! Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jeleljenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (OGYÉI) a www.ogyei.gov.hu honlapon található online mellékhatás-bejelentő felületen keresztül, illetve a honlapról letölthető mellékhatás-bejelentő lapon jelenthet, vagy bármilyen nem-kivánatos eseményt elküldhet a Boehringer Ingelheim International GmbH magyarországi elérhetőségére: pv_local_hungary@boehringer-ingelheim.com

Kérjük, segítse munkánkat azáltal, hogy mellékhatás bejelentését csak egy helyre juttatja el, vagy az OGYÉI-nak, vagy a Boehringer Ingelheim International GmbH felé.

A gyógyszerrel kapcsolatos további kérdéseivel keressen minket a következő e-mail címen: medinfo.hu@boehringer-ingelheim.com

* A JARDIANCE a glükózszt szint csökkentése mellett igazoltan csökkenti a testsúlyt és a vérnyomást, azonban a JARDIANCE nem rendelkezik javallattal a testsúly-, illetve a vérnyomáscsökkentésre.

** Gyógyszer család: Jardiance és Synjardy együtt, Magyarország, originális, nem-inzulin antidiabetikumok: DPP4-gátlók, GLP1-receptoragonisták, SGLT2-gátlók
Nem megfelelően kontrollált 2-es típusú cukorbetegségben, CAD-ban, PAD-ban szenvedő felnőttek, illetve kórtörténetben szereplő szívinfarktus vagy stroke.*

CVD: CARDIOVASCULARIS BETEGSÉG; MI: SZÍVINFARKTUS; PAD: PERIFÉRIÁS ARTÉRIÁS BETEGSÉG; CAD: KORONÁRIA BETEGSÉG

PC-HU-102200. Lezárva: 2021. 11. 19.



PROGRAMBIZOTTSÁG

Prof. Dr. Wittmann István (elnök)

Prof. Dr. Várkonyi Tamás (titkár)

Prof. Dr. Barkai László

Molnárné Molnár Ágnes

Dr. Molnár Gergő Attila Ph.D

Prof. Dr. Hosszúfalusi Nóra

Prof. Dr. Jermendy György

Prof. Dr. Kempler Péter

Prof. Dr. Lengyel Csaba

Prof. Dr. Winkler Gábor

SZERVEZŐBIZOTTSÁG

Prof. Dr. Lengyel Csaba (társelnök)

Prof. Dr. Várkonyi Tamás (társelnök)

Prof. Dr. Wittmann István (az MDT elnöke)

Dr. Nyíraty Szabolcs Ph.D

Dr. Vágvölgyi Anna

HELYSZÍN

József Attila Tanulmányi és Információs Központ

6722 Szeged, Ady tér 10.

Telefon: +36 62 546 600 • Web: <https://u-szeged.hu/tik>

KONGRESSZUSI SZERVEZŐIRODA



STAND-ART Event Management

6723 Szeged, Tisza Palota H/17.

Felső Tisza-part 31-34.

Tel: +36 62 999 950 • Fax: +36 62 661 331

E-mail: info@stand-art.hu

Számlacím: 6792 Zsombó, Juhász Gy.u.16.

Dr. Bernáth József, ügyvezető
(szponzori támogatások, kiállítás)

E-mail: joe@stand-art.hu

Jakab Laura, ügyvezető
(számlázás és pénzügyek)

E-mail: laura@stand-art.hu

Dr. Garhuth Anita, project manager
(tudományos program, előadás absztraktok)

E-mail: anita@stand-art.hu

Lacsán Dóra, ügyvezető
(regisztráció, szponzori támogatások, kiállítás)

E-mail: dora@stand-art.hu

Kálmán Kata, project manager
(szállásfoglalás)

E-mail: kata@stand-art.hu

KONGRESSZUSI IRODA, REGISZTRÁCIÓ

Szeptember 8-án 11.00 – 18.45

Szeptember 9-én 08.00 – 18.45

Szeptember 10-én 08.00 – 18.10

Szeptember 11-én 08.00 – 14.10

Regisztrációs iroda telefonszáma: +36 30 619 7348, +36 30 637 3404

A KONGRESSZUS HONLAPJA

www.diabet.hu/MDT2022

SZAKDOLGOZÓI PONTOK JÓVÁÍRÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK REGISZTRÁCIÓJA

<https://stand-art.hu/urlap/MDT2022-Szakdolgozoi-urlap>

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

MDT 2022 regisztrációs díjak	Korai regisztrációs díj 2022. június 30-ig	Regisztrációs díj 2022. június 30. után
MDT 35 év feletti orvos tagjai	50 000 Ft	58 000 Ft
MDT 35 év feletti orvos tagjai (KÖZLEKEDÉSI JEGGYEL)	53 000 Ft	61 000 Ft
MDT szakdolgozó tagjai, 35 év alatti orvos és nem orvos tagjai	35 000 Ft	45 000 Ft
MDT szakdolgozó tagjai, 35 év alatti orvos és nem orvos tagjai (KÖZLEKEDÉSI JEGGYEL)	38 000 Ft	48 000 Ft
Nem MDT tag orvosok	58 000 Ft	68 000 Ft
Nem MDT tag orvosok (KÖZLEKEDÉSI JEGGYEL)	61 000 Ft	71 000 Ft
Nem MDT tag szakdolgozó, ill. nem orvos	40 000 Ft	50 000 Ft
Nem MDT tag szakdolgozó, ill. nem orvos (KÖZLEKEDÉSI JEGGYEL)	43 000 Ft	53 000 Ft
Kiállítók, cégképviselők	55 000 Ft	65 000 Ft
Kiállítók, cégképviselők (KÖZLEKEDÉSI JEGGYEL)	58 000 Ft	68 000 Ft
MDT tag orvostanhallgatók, 65 év feletti, PhD hallgatók, rezidensek	32 000 Ft	42 000 Ft
MDT tag orvostanhallgatók, 65 év feletti, PhD hallgatók, rezidensek (KÖZLEKEDÉSI JEGGYEL)	35 000 Ft	45 000 Ft
Nem MDT tag orvostanhallgatók, 65 év feletti, PhD hallgatók, rezidensek	37 000 Ft	47 000 Ft
Nem MDT tag orvostanhallgatók, 65 év feletti, PhD hallgatók, rezidensek (KÖZLEKEDÉSI JEGGYEL)	40 000 Ft	50 000 Ft
Kísérők	40 000 Ft	40 000 Ft
Kísérők (KÖZLEKEDÉSI JEGGYEL)	43 000 Ft	43 000 Ft
Napidíj - 2022. szeptember napra	20 000 Ft/nap	20 000 Ft/nap

A regisztrációs díjak tartalma: kávészünetek, vacsorák, hideg ebédcsomagok, kitűző, konferencia táska a kongresszusi anyagokkal, belépés az összes szekcióra, előadásra, a szponzori kiállításra, közlekedésijegyet, valamint tartalmazza a mindenkori ÁFA összegét is. A megfelelő regisztrációs díj továbbá tartalmaz egy **72 órás szegedi tömegközlekedési jegyet is**.

A teljes regisztrációs díj étkezési költség tartalma: 10.000 Ft/nap.

A napidíj tartalmazza az aznapi kávészünet fogyasztást, hideg ebédcsomagot, kitűzőt, konferencia táskát a kongresszusi anyagokkal, belépést az összes aznapi szekcióra, előadásra, a szponzori kiállításra, valamint tartalmazza a mindenkori ÁFA összegét is. A napidíj étkezési költség tartalma: 6.000 Ft/nap.

A regisztrációs díjak étkezési költség tartalma a számlán külön tételként kerül feltüntetésre.

SZÁMLÁZÁS

A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállított számlán az érvényes jogszabályok szerint tüntetjük fel. A részvételi díjak étkezéstartalma külön tételként kerül a számlán feltüntetésre. Számlamódosítás, új számla kiállítása a konferencia végéig, legkésőbb 2022. szeptember 08-ig lehetséges. Ezen időpont után a megrendelésen és az erről kiállított számlán változtatni már nincs lehetőség. Amennyiben regisztrációs díjának befizetése nem érkezik meg bankszámlánkra 2022. augusztus 08-ig, úgy az igényelt szolgáltatásokat és regisztrációját töröljük. Köszönjük megértését!

A résztvevő/megrendelő a jelentkezése során nyilatkozott, hogy tudomással bír arról, hogy a STAND-ART Event Management Kft. további felek bevonásával, közvetítőként nyújtja a rendezvény szervezésével kapcsolatos szolgáltatásokat.

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Regisztráció díjmentes módosítására ill. lemondására 2022. augusztus 08-ig volt lehetőség, azt követően díjak kiszámlázásra kerülnek a kötbéres szerződéseink miatt. Rendezvényt követően kiállított végszámlákat – Résztvevő/Díjfizető kérésére – stornózni, és új számlát kiállítani a mindenkori önrevízió költségének Résztvevő/Díjfizető általi megfizetése ellenében van lehetőség. Számla költségterítés nélküli stornózására és új számla kiállítására kizárólag a Szolgáltató adminisztrációs hibájából adódóan kiállított számlák esetében van lehetőség.

A KONGRESSZUS HIVATALOS NYELVE

magyar

KONGRESSZUSI KITŰZŐK

A kongresszusi előadások és a kiállítás csak kitűzővel látogathatók.

TAXI



A kongresszus hivatalos személyszállítója a Tempó Taxi (hívószám: +36 62 490 490, +36 30 282 2222, +36 20 982 2222), a kitűző felmutatásával az utazás az aktuálisan érvényes legalacsonyabb tarifával vehető igénybe.

INTERNET



A T.I.K. területén elérhető wireless hálózat adatai:
Network: SZTE-KONF
Jelszó: a T.I.K. ügyfélszolgálaton kérhető

TÁRSASÁGI PROGRAMOK

Helyszín: **PICK Aréna Edzőcsarnok** – 6723 Szeged, Felső Tisza-part 1-3.

Fogadás: 2022. szeptember 8., csütörtök 20.30

Gálavacsora: 2022. szeptember 9., péntek 20.30

Helyszín: **Fehértói Halászcserda** – 6728 Szeged, Budapesti út 41.

Záróvacsora: 2022. szeptember 10., szombat 20.30

MDT STAND

Szeretettel várjuk a Magyar Diabetes Társaság webstandján, ahol minden, a Társasággal kapcsolatos információ beszerezhető. A Diabetologia Hungarica, az MDT honlapja (www.diabet.hu), a Diabetes páciensújság és annak honlapja (www.diabetes.hu) szolgáltatásairól itt tájékozódhat.

Kérjük a társaság tagjait, keressék fel a web-standot, ismerkedjenek meg honlapunk szolgáltatásaival, és frissítsék személyes adataikat az internetes tagnyilvántartásban. A kiállításon a Tudomány Kiadó és az IntelliMed munkatársai vesznek részt.

ELŐADÁSOK ANYAGÁNAK LEADÁSA ÉS FELTÖLTÉSE

Kérünk minden előadót, hogy szíveskedjen a prezentáció anyagát min. 3 órával az előadás időpontja előtt leadni az Átriumban található feltöltő ponton a technikusoknak. A reggeli előadásokat kérjük, hogy lehetőség szerint előző nap legyenek szívesek leadni.

SZÁLLÁSINFORMÁCIÓ

A <https://stand-art.hu/MDT2022/Szallasinformacio> honlapon a Szálláshelyek menüpont alatt található.

PARKOLÁS

A legtöbb szálláshely a vendégek számára ingyenes, zárt parkolási lehetőséget biztosít. Szeged belvárosában, ill. a konferencia helyszínén a fizető parkolóhelyeket előre váltott jogosultsággal lehet igénybe venni. A fizető parkolás időtartama munkanapokon 08:00 órától 18:00 óráig, valamit szombaton a (Mars tér környékén) 08:00 órától 12:00 óráig terjed.

MOBIL PARKOLÁS:

Szegeden a 6720, 6721 zónakódokkal lehet a mobilfizetést indítani. attól függően, hogy melyik zónában várakozik a jármű.

Az parkolási renddel, a zónákkal kapcsolatosan a szegedi parkoló jegykiadó automatákon elhelyezett tájékoztatón, illetve a www.szepark.hu/parkolasinfo oldalon kapnak bővebb tájékoztatást.

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS


A rendezvény közzétett részvételi díja nem tartalmaz baleset-, betegség-, poggyász- és felelősségbiztosítási díjat, így a felsorolt események bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.

AKKREDITÁCIÓ

A rendezvény diabetológus, háziorvos, belgyógyász, endokrinológus, gyermekgyógyász, kardiológus, nefrológus, neurológus, szemész, sebész, érsebész, szülész-nőgyógyász, urológus, aneszteziológus és intenzív terápiás, oxológus, reumatológus és rehabilitációs szakorvosok és szakdolgozók számára hivatalos, pontszerző továbbképző oktatási programnak minősül. A kongresszuson részt vevő orvosok 24, szakdolgozók 12 akkreditációs pontot kapnak.

**STAND-ART****Event Management**

által szervezett rendezvények átfogó mobil alkalmazása
iOS és Android eszközökre

**AZ ALKALMAZÁS MAGYARUL/ANGOLUL ELÉRHETŐ ALAPFUNKCIÓI**

1. Időbeosztás: az Ön által meglátogatni kívánt események listája
2. Szekciók, előadások: a rendezvény komplett, naprakész programja
3. Előadók: a rendezvény meghívott előadói és előadásaik helyszíne/időpontja
4. Absztraktok: az előadások és poszterek absztraktjai
5. A rendezvény támogatói (elérhetőségek, rövid bemutatkozás)
6. Térkép: a szekciók és egyéb programok helyszínei, valamint a kiállítás alaprajza
7. Kövesse az eseményeket a Facebook oldalán is!
8. Váltson üzenetet a résztvevőkkel, tegyen fel kérdéseket az előadóknak az üzenőfalon!
9. Értesítés: helyszín vagy időpont változás? Különleges előadás téma?
Az értesítés egyenesen a mobil eszközre érkezik, hogy Ön ne maradjon le semmiről!

MDT XXX. KONGRESSZUSA – ÁTTEKINTŐ PROGRAM

2022. szeptember 8., csütörtök

Időpont	KONGRESSZUSI TEREM	„B SZEKCIÓ”
13.00 – 13.30	Megnyitó/ MDT Közgyűlés I. időpont (Prof. Dr. Rovó László, Prof. Dr. Wittmann István, Prof. Dr. Lengyel Csaba, Prof. Dr. Várkonyi Tamás)	
13.30 – 14.30	MDT Diabetes EPI vizsgálat (üléelnök: Prof. Dr. Kempler Péter előadók: Prof. Dr. Jermendy György, Prof. Dr. Kempler Péter, Prof. Dr. Wittmann István)	
14.30 – 15.30	Dr. Kolossváry Endre (MAÉT elnök) előadása 30’ és Prof. Dr. Becker Dávid (MKT elnök) előadása 30’ (üléelnökök: Prof. Dr. Wittmann István, Prof. Dr. Várkonyi Tamás)	
15.30 – 16.00	Szünet	
16.00 – 17.15	Neuropathia (üléelnökök: Prof. Dr. Kempler Péter, Prof. Dr. Jermendy György)	Diabétesssel társuló kórfarmák (üléelnökök: Prof. Dr. Lengyel Csaba, Dr. Kis János Tibor)
17.15 – 18.45	TIDM I. (üléelnökök: Prof. Dr. Somogyi Anikó, Prof. Dr. Barkai László)	A diabétesz pszichoszociális aspektusai (üléelnökök: Dr. Katona Éva, Dr. Oláh Ilona)
20.30 –	Vacsora	

2022. szeptember 9., péntek

Időpont	KONGRESSZUSI TEREM	„B SZEKCIÓ”
08.30 – 10.30	Diabétesz és COVID-19 (üléelnökök: Prof. Dr. Winkler Gábor, Dr. Sudár Zsolt)	8:00-10:00 Dietetika, edukáció (üléelnökök: Dr. Vándorfi Győző, Molnár Ágnes)
10.30 – 11.00	Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. Szimpózium (előadó: Prof. Dr. Várkonyi Tamás)	
11.00 – 11.20	Szünet	
11.20 – 12.20	Novo Nordisk Hungária Kft. szimpózium I. (üléelnök: Prof. Dr. Kempler Péter előadók: Prof. Dr. Hosszúfalusi Nóra, Prof. Dr. Lengyel Csaba, Dr. Molnár Gergő Attila)	Mölnlycke Health Care Kft. szimpózium (előadók: Dr. Kökény Zoltán, Dr. Rozsos István)

12.25 – 13.25	AstraZeneca Kft. szimpózium (üléelnök: Prof. Dr. Wittmann István előadók: Prof. Dr. Várkonyi Tamás, Dr. Simonyi Gábor, Dr. Dudás Mihály)	Teva Gyógyszergyár Zrt. szimpózium (üléelnök: Prof. Dr. Páll Dénes előadók: Dr. Szilávik János, Dr. Pilling János)
13.25 – 14.25	Ebédszünet	
14.25 – 15.25	Hetényi emlékelőadás - Dr. Kiss Zoltán (üléelnökök: Prof. Dr. Wittmann István, Prof. Dr. Várkonyi Tamás)	
	Tamás Gyula emlékelőadás – Dr. Sélley Eszter (üléelnökök: Prof. Dr. Wittmann István, Prof. Dr. Várkonyi Tamás)	
15.25 – 16.25	77 Elektronika Kft. szimpózium (üléelnök: Prof. Dr. Lengyel Csaba előadók: Szabó Bálint, Prof. Dr. Várkonyi Tamás, Dr. Brasnyó Pál)	Medtronic Hungária Kft. szimpózium (üléelnök: Dr. Kocsis Győző előadók: Dr. Kocsis Győző, Dr. Bakó Barnabás, Dr. Tóth-Heyn Péter, Prof. Dr. Hosszúfalusi Nóra)
16.25 – 16.40	Szünet	
16.40 – 17.40	Sanofi-Aventis Zrt. szimpózium I. (üléelnök: Prof. Dr. Wittmann István előadók: Dr. Molnár Gergő, Dr. Balogh Zoltán, Dr. Keresztes Katalin)	Roche Magyarország Kft. szimpózium (üléelnökök: Prof. Dr. Becker Dávid, előadók: Dr. Kis János Tibor, Dr. Hasitz Ágnes, Prof. Dr. Tomcsányi János)
17.45 – 18.45	Lilly Hungária Kft. szimpózium I. (üléelnök: Prof. Dr. Lengyel Csaba, előadók: Prof. Dr. Tomcsányi János, Dr. Dózsa Katalin, Zeley Réka)	MSD Pharma Hungary Kft. szimpózium (üléelnök: Prof. Dr. Jermendy György szakértők: Dr. Nádas Judit, Dr. Keresztes Katalin, Dr. Kis János Tibor)
20.30 –	Vacsora	

2022. szeptember 10., szombat

Időpont	KONGRESSZUSI TEREM	„B SZEKCIÓ”
08.30 – 09.30	Richter Gedeon Nyrt. szimpózium I. (üléelnök: Prof. Dr. Kempler Péter előadók: Prof. Dr. Ábrahám György)	Lilly Hungária Kft. szimpózium II. (üléelnök: Prof. Dr. Wittmann István, előadók: Dr. Földesi Irén, Dr. Fülöp Gábor)
09.35 – 10.35	Richter Gedeon Nyrt. szimpózium II. (üléelnök: Prof. Dr. Kempler Péter előadók: Prof. Dr. Jermendy György, Dr. Körei Anna)	Civil szervezetek bemutatkozása (üléelnök: Prof. Dr. Wittmann István, Prof. Dr. Várkonyi Tamás)
10.35 – 11.00	Szünet	
11.00 – 13.00	MDT Közgyűlés II. időpont	
13.00 – 14.00	Boehringer Ingelheim RCV szimpózium (kerekasztal Dr. Dósa Ágnes, Prof. Dr. Wittmann István és Dr. Habon Tamás közreműködésével)	Magyar Mesterséges Pancreas Munkacsoport (üléelnök: Prof. Dr. Barkai László, Prof. Dr. Kovács Levente)
14.00 – 15.00	Ebédszünet	

15.00 – 16.00	Novo Nordisk Hungária Kft. szimpózium II. (üléelnök: Dr. Körner Anna előadók: Dr. Taybani Zoltán, Dr. Sudár Zsolt, Dr. Kocsis Győző)	Sandoz Hungária Kft. szimpózium (üléelnök: Prof. Dr. Lengyel Csaba, előadók: Dr. Bódis Beáta, Dr. Rosta László)
16.05 – 17.05	Sanofi-Aventis Zrt. szimpózium II. (üléelnök: Prof. Dr. Várkonyi Tamás előadók: Dr. Katona Éva Melitta, Dr. Nyiraty Szabolcs)	Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. szimpózium (előadók: Dr. Hajdú Edit, Dr. Schandl László, Dr. Szlávik János)
17.10 – 18.10	Viatris szimpózium (előadók: Prof. Dr. Bajnok László, Dr. Reiber István)	Diabeteszes láb munkacsoport vezetőségválasztás
20.30 –	Vacsora	

2022. szeptember 11., vasárnap		
Időpont	KONGRESSZUSI TEREM	„B SZEKCIÓ”
08.15 – 10.00	Varia (üléelnökök: Dr. Kántor Irén, Dr. Rosta László)	Személyre szabott terápia (üléelnökök: Dr. Petró Gizella Dr. Taybani Zoltán)
10.00 – 11.15	Diabétesz és kardiovaszkuláris állapot (üléelnökök: Dr. Hidvégi Tibor, Dr. Molnár Gergő Attila)	TIDM II. (üléelnökök: Dr. Kocsis Győző, Dr. Blatniczky László)
11.15 – 11.30	Szünet	
11.30 – 13.00	Epidemiológia, szűrés (üléelnökök: Prof. Dr. Hosszúfalusi Nóra, Prof. Dr. Várkonyi Tamás)	A diabetesz tipizálásának és genetikai hátterének kérdései (üléelnökök: Dr. Fülöp Gábor, Dr. Gaál Zsolt)
13.00 – 14.00	Diabétesz gondozás (üléelnökök: Dr. Körner Anna, Prof. Dr. Gerő László)	
14.00 – 14.10	A kongresszus zárása	
14.10 –	Ebéd	

TUDOMÁNYOS PROGRAM

2022. szeptember 8., csütörtök – Kongresszusi terem

13:00 – 13:30 **Megnyitó/MDT Közgyűlés I. időpont**

Dr. Tóth László, Prof. Dr. Rovó László, Prof. Dr. Wittmann István, Prof. Dr. Lengyel Csaba, Prof. Dr. Várkonyi Tamás

13:30 – 14:30 **MDT Diabetes EPI vizsgálat**

Üléselnök: Prof. Dr. Kempler Péter

A 2-es típusú diabetes mellitus (T2DM) antihyperglykaemiás kezelésének alakulása Magyarországon 2015–2020 között: a NE-AK-adatbázis elemzésének eredményei

Prof. Dr. Jermendy György

A 2-es típusú diabetes mellitus jellegzetességei hazánkban: adatbázis-elemzésen alapuló, hosszú távú klinikai epidemiológiai vizsgálat eddigi eredményeinek rövid összefoglalása

Prof. Dr. Kempler Péter

A 2-es típusú cukorbetegség és a tumor előfordulása hazánkban

Prof. Dr. Wittmann István

14:30 – 15:30 **Dr. Kolossváry Endre (MAÉT elnök) előadása és Prof. Dr. Becker Dávid (MKT elnök) előadása**

Üléselnökök: Prof. Dr. Wittmann István, Prof. Dr. Várkonyi Tamás

15:30 – 16:00 **Szünet**

16:00 – 17:15 **Neuropathia**

Üléselnökök: Prof. Dr. Kempler Péter, Prof. Dr. Jermendy György

PROFESSZOR KÉRDEZ PROFESSZORT – NEUROPATHIA DIABETICA: KÉRDÉSEK ÉS ÚJABB KÉRDÉSEK

Kempler Péter Prof. Dr.,⁽¹⁾ Várkonyi Tamás Prof. Dr.⁽²⁾

¹SE ÁOK, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest, ²SZTE ÁOK Belgyógyászati Klinika, Szeged,

AZ AUTONÓM ÉS A SZENZOROS IDEGRENDSZERI FUNKCIÓK VIZSGÁLATA VESETRANSZPLANTÁLT BETEGEKBEN

Vágvölgyi Anna Dr.,⁽¹⁾ Várkonyi Tamás Prof. Dr.,⁽¹⁾ Borda Bernadett PhD.,⁽²⁾ Orosz Andrea PhD.,⁽³⁾ Szűcs Mónika,⁽⁴⁾ Nemes Attila Prof. Dr.,⁽¹⁾ Lázár György Prof. Dr.,⁽²⁾ Baczkó István PhD.,⁽³⁾ Kempler Péter Prof. Dr.,⁽⁵⁾ Lengyel Csaba Prof. Dr.,⁽¹⁾

¹SZTE ÁOK Belgyógyászati Klinika, Szeged, ²SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged, ³SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Szeged, ⁴SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, Szeged, ⁵SE ÁOK, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest

A DIABETESES NEUROPATHIA ÉS EGYÉB SZÖVŐDMÉNYEK ELŐFORDULÁSA A DEBRECENI EGYETEM DIABETESES NEUROPATHIA CENTRUM BETEGEINEK KÖRÉBEN

Sztanek Ferenc Dr.,⁽¹⁾ Hajdú Anna,⁽¹⁾ Molnár Ágnes,⁽¹⁾ Pető Attila Dr.,⁽³⁾ Paragh György Prof. Dr.,⁽¹⁾ Harangi Mariann Dr.,⁽¹⁾ Nagy Attila Csaba Dr.,⁽²⁾

¹Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere Betegségek Tanszék, ²Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Intervenciók Epidemiológia Tanszék, ³Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

DIABÉTESZES NEURÓPÁRIA SZŰRÉS TAPASZTALATAI

Oláh Ilona Dr.,⁽¹⁾ Hévízi Zsombor,⁽²⁾ Vörös Krisztián Dr.,⁽²⁾

¹Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, ²Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék

17:15 – 18:45

TIDM I.

Üléselnökök: Prof. Dr. Somogyi Anikó, Prof. Dr. Barkai László

FELNŐNEK A GYEREKEK. A FELNÖTT GONDOZÁSBA ÁTADOTT DIABÉTESZES GYERMEKEK NYOMON KÖVETÉSE

Körner Anna Dr.,⁽¹⁾

¹Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika, Budapest

VALÓS IDEJŰ SZÖVETI GLÜKÓZMÉRÉS BEVEZETÉSÉNEK HATÁSA ICT-VEL KEZELT 1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZES BETEGEINKNÉL

Garam Nóra Dr.,⁽¹⁾ Svébis Márk Dr.,⁽¹⁾ Tamás Jávorfi Dr.,⁽¹⁾ Tóth Beatrix,⁽¹⁾ Ferenczi Tamás Dr.,⁽²⁾ Eigner György Dr.,⁽¹⁾ Siket Máté,⁽²⁾ Fazakas-Dénes Lehel,^(1,2) Kocsis Győző Dr.,⁽¹⁾

¹Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest ²Óbudai Egyetem, Budapest

FOLYAMATOS SZÖVETI GLÜKÓZ MONITOROZÁS IDŐSKORBAN

Domboróczki Zsolt Dr.,^(1, 2, 3)

¹Markhot Ferenc Oktatókórház, Eger, ²Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján, ³Vasútegészségügyi Rendelőintézet, Miskolc

A CGM-MEL MÉRT PARAMÉTEREKET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA 1-ES TÍPUSÚ ÉS INZULINNAL KEZELT 2-ES TÍPUSÚ DIABETESBEN

Nyiraty Szabolcs Dr.,⁽¹⁾ Vágvölgyi Anna Dr.,⁽¹⁾ Várkonyi Ákos⁽¹⁾ Tóth Bettina Dr.,⁽¹⁾ Pesei Fruzsina Dr.,⁽¹⁾ Bordács Barbara Dr.,⁽¹⁾ Orosz Andrea Dr.,⁽²⁾ Lengyel Csaba Prof. Dr.,⁽¹⁾ Kempler Péter Prof. Dr.,⁽³⁾ Várkonyi Tamás Prof. Dr.,⁽¹⁾

¹Szegedi Tudományegyetem, Belgyógyászati Klinika, Szeged, ²Szegedi Tudományegyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, Szeged,

³Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest

FOLYAMATOS SZÖVETI GLÜKÓZ MÉRÉS RÖVID TÁVÚ HATÁSA 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEINK SZÉNHYDRÁT-ANYAGCSERE PARAMÉTEREIRE

Nagy Géza Dr.,⁽¹⁾ Pálmai Dóra,⁽¹⁾ Székely Tekla,⁽¹⁾ Csíkos Ágnes,⁽¹⁾ Hoszszúfalusi Nóra Prof. Dr.,⁽¹⁾ Pusztai Péter Dr.,⁽¹⁾ Somogyi Anikó Prof. Dr.,⁽¹⁾ Sármán Beatrix Dr.,⁽¹⁾

¹Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest

TECHNOLÓGIAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA IDŐSEBB ÉLETKORBAN 1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZBEN: INZULINPUMPA KEZELÉS

Molnár Gergő Attila Dr.,⁽¹⁾

¹Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ/Általános Orvostudományi Kar, II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum

20:30 –

Vacsora

16:00 – 17:15 **Diabétesszel társuló kórformák**

Üléselnökök: Prof. Dr. Lengyel Csaba, Dr. Kis János Tibor

OXIDÁLT FENILALANIN-SZÁRMAZÉKOK BEÉPÜLÉSE AZ INZULIN-JELÁTVITEL FEHÉRJÉBE ÖSSZEKAPCSOLHATJA AZ OXIDATÍV STRESSZT ÉS A KRÓNIKUS INZULIN-REZISZTENCIÁT

Mohás-Cseh Judit MD.,⁽¹⁾ Molnár Gergő, Attila PhD.,⁽¹⁾ Pap Mariana PhD.,^(2,3) Laczy Boglárka PhD.,⁽¹⁾ Vas Tibor PhD.,⁽¹⁾ Kertész Melinda,⁽¹⁾ Németh Krisztina PhD.,⁽⁴⁾ Hetényi Csaba PhD.,⁽⁵⁾ Csikós Orsolya PhD.,⁽⁶⁾ K. Tóth Gábor Prof. Dr.,⁽⁶⁾ Reményi Attila PhD.,⁽⁴⁾ Wittmann István Prof. Dr.,⁽¹⁾ ¹Klinikai Központ II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum, ²Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium, ³Pécsi Tudományegyetem, Szentágotthai János Kutatóközpont, ⁴Természettudományi Kutatóközpont Szerves Kémiai Intézet, Budapest, ⁵Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, ⁶Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Orvosi Vegytani Intézet

AZ ELŐREHALADOTT GLIKÁCIÓS VÉGTERMÉKEK (AGES) ÉS AZOK SZOLUBILIS RECEPTORÁNAK (SRAGE) VIZSGÁLATA HASHIMOTO-THYREOIDITISBEN

Bak-Csiha Sára,⁽³⁾ Molnár István Dr.,⁽²⁾ Diószegi Ágnes Dr.,⁽²⁾ Paragh György Prof. Dr.,⁽²⁾ Nagy V Endre Prof. Dr.,⁽¹⁾ Bodor Miklós Dr.,^(1,3) Katkó Mónika PhD.,⁽¹⁾ Katona Éva Dr.,⁽²⁾ Harangi Mariann Dr.,⁽²⁾ Berta Eszter Dr.,^(1,3) ¹Debreceni Egyetem, ÁOK, Belgyógyászati Intézet, Endokrinológia Tanszék, ²Debreceni Egyetem, ÁOK, Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere Tanszék, ³Debreceni Egyetem, GYTK, Gyógyszerészeti Alapismeretek Tanszék

A PANCREATECTOMIZÁLT BETEGEK DIABETESÉNEK KEZELÉSÉVEL NYERT TAPASZTALATAINK

Kis János Tibor Dr.,^(1,2) Szemán Andrea Dr.,⁽¹⁾ Kiss Krisztina Dr.,⁽¹⁾ Grosz Andrea Dr.,⁽²⁾ Mészáros Péter Dr.,⁽³⁾ Dubóczky Zsolt Dr.,⁽³⁾ Hardy Vajk Dr.,⁽⁴⁾ Schandl László Dr.,⁽¹⁾ Winkler Gábor Prof. Dr.,^(1,5) ¹II-es Belgyógyászat, Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő, Budapest, ²Diabetológia, Betegellátó Irgalmas Rend, Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest, ³Daganatsebészeti Centrum, Országos Onkológiai Intézet, Budapest, ⁴Gasztroenterológia, Betegellátó Irgalmas Rend, Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest, ⁵Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar, Elméleti Egészségtudományi Intézet, Miskolc

SZÉNHYDRÁT-ANYAGCSERE ZAVAROK ELŐFORDULÁSÁNAK VIZSGÁLATA GRAVES-BASEDOW KÓR MIATT GONDOZOTTBETEGEINK KÖRÉBEN

Diószegi Ágnes Dr.,⁽¹⁾ Molnár István Dr.,⁽²⁾

¹DE KK Belgyógyászati Klinika, Anyagcsere-betegségek Tanszék, ²DEKK Belgyógyászati Klinika, Endokrinológiai Tanszék

VASHÁZTARTÁS ÉS ANYAGCSERE DISZFUNKCIÓHOZ TÁRSULÓ ZSÍRMÁJBETEGSÉG

Éltes Zsombor,⁽¹⁾ Pfeifer Hannelore,⁽¹⁾ **Szabó Monica Dr.,^(1,2)**

¹Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technikai Egyetem,

²Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinika

17:15 – 18:30

A diabétesz pszichoszociális aspektusai

Üléseelnökök: Dr. Katona Éva, Dr. Oláh Ilona

VISELKEDÉSI JELLEMZŐK FELTÁRÁSÁNAK SZEREPE A 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZ KEZELÉSÉBEN

Buzás Norbert PhD.,⁽¹⁾ Klinovszky Andrea PhD.,⁽¹⁾ Papp-Zipernovszky

Orsolya

PhD.,⁽²⁾

¹SZTE SZAOK Egészség-gazdaságtani Intézet, Szeged, ²SZTE BTK Pszichológiai Intézet, Szeged

A CSOPORTHATÁS BEFOLYÁSA AZ 1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESSZEL ÉLŐ GYERMEKEK SZÜLEINEK KÖRÉBEN

Tesch Zsanett,⁽¹⁾ Buzás Norbert PhD.,⁽¹⁾

¹SZTE SZAOK, Egészség-gazdaságtani Intézet, Szeged

DIABÉTESZ GONDOZÁS AZ ISKOLÁBAN ÉS AZ ÓVODÁBAN: PEDAGÓGUSOK DIABÉTESZ GONDOZÁSSAL KAPCSOLATOS ATTITÚDJÉNEK ÉS TUDÁSÁNAK VIZSGÁLATA

Horváth Mária Dóra,^(1,2) Buzás Norbert PhD.,⁽¹⁾ Tesch Zsanett,⁽¹⁾

Papp-Zipernovszky Orsolya PhD.,⁽²⁾

¹Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Egészség-gazdaságtani Intézet, Szeged, ²Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Szeged

A DIÉTÁS ÖNBIZALMAT MEGHATÁROZÓ PSZICHOSZOCIÁLIS TÉNYEZŐK SZEREPE 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK ESETÉN

Köbbling Tamás Dr.,⁽¹⁾ Páll Dénes Prof. Dr.,⁽¹⁾ Somodi Sándor Dr.,⁽²⁾ Maroda László Dr.,⁽¹⁾ Váradi Zita Dr.,⁽¹⁾ Zrinyi Miklós Dr.,⁽¹⁾ Katona Éva Melitta Dr.,⁽²⁾

¹Debreceni Egyetem, ÁOK, Orvosi Klinikai Farmakológiai Tanszék, ²Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere Betegségek Nem Önálló Tanszék

FOLYAMATOS GLÜKÓZMONITOROZÁSSAL (CGM) VALÓ ELÉGETTSÉG 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEG FELNŐTTEKNÉL

Lukács Andrea PhD.,⁽¹⁾ Laura Brigitta Szerencsi,⁽¹⁾ László Barkai Prof. Dr.,^(1, 2, 3)

¹Miskolci Egyetem, Egészségtudományi Kar, ²Óbudai Egyetem, Élettani Szabályozások Kutatóközpont, ³P.J. Safarik Egyetem, Orvostudományi Kar

20:30 –

Vacsora

08:30 – 10:30 **Diabétesz és COVID-19**

Üléselnökök: Prof. Dr. Winkler Gábor, Dr. Sudár Zsolt

A COVID-19 ELLENI VÉDŐOLTÁSOK HATÁSA A MAGYARORSZÁGI CUKORBETEG FELNŐTTEK HALÁLOZÁSÁRA

Pálinkás Anita Dr.,⁽¹⁾ Vincze Ferenc Dr.,⁽¹⁾ Sándor János Prof. Dr.,⁽¹⁾

¹Népegészség- és Járványtani Intézet, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A HgbA1c ÉS SZEMÉSZETI VIZSGÁLATON RÉSZT VETT CUKORBETEGEK ARÁNYÁNAK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON A COVID-19 PANDÉMIA TÜKRÉBEN

Vincze Ferenc Dr.,⁽¹⁾ Pálinkás Anita Dr.,⁽¹⁾ Sándor János Prof. Dr.,⁽¹⁾

¹Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészség- és Járványtani Intézet, Debrecen

MIBEN BŰNÖS A COVID?

Bara Zsanett Dr.,⁽¹⁾ Juhász Éva Dr.,⁽¹⁾ Felszeghy Enikő Dr.,⁽¹⁾

¹DEKK Gyermekgyógyászati Intézet

A COVID-19 PANDÉMIA HATÁSA A TERÁPIA MÓDOSÍTÁSRA DIABETOLÓGIAI GONDOZÁSUNK BETEGANYAGÁBAN

Fehérvári Mária Dr.,⁽¹⁾ Móricz István Dr.,⁽¹⁾ Czine Zsigmond Dr.,⁽¹⁾ Gaál Zsolt Dr.,⁽¹⁾

¹Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház- Jósa András Oktatókórház, IV. Belgyógyászat

A COVID-19 ELLENI ÁTOLTOTTSÁG DETERMINÁNSAI 2021-BEN A MAGYARORSZÁGI 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN

Sándor János Prof. Dr.,⁽¹⁾ Vincze Ferenc Dr.,⁽¹⁾ Pálinkás Anita Dr.,⁽¹⁾

¹Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Népegészség- és Járványtani Intézet

A KORONAVÍRUS FERTŐZÉS INCIDENCIÁJA, ÉS A FERTŐZÉSEL KAPCSOLATOS HALÁLOZÁS 2-ES TÍPUSÚ DIABETESES BETEGEK-BEN: HUN-COV-DIAB-1 TANULMÁNY

Sütő Gábor Prof. Dr.,⁽¹⁾ Vókó Zoltán Prof. Dr.,⁽²⁾ Laczy Boglárka Dr.,⁽¹⁾

Molnár Gergő Attila Dr.,⁽¹⁾ Kiss Zoltán Dr.,⁽¹⁾ Nagy Dávid Dr.,⁽²⁾ Surján György Dr.,⁽³⁾ Surján Orsolya Dr.,⁽⁴⁾ Nagy Péter Dr.,⁽⁵⁾ Kenessey István

Dr.,⁽⁵⁾ Wéber András Dr.,⁽⁵⁾ Pálosi Mihály Dr.,⁽⁶⁾ Müller Cecília Dr.,⁽⁴⁾ Kásler Miklós Prof. Dr.,^(5, 7) Wittmann István Prof. Dr.,⁽¹⁾

¹PTE KK II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum,

²SE, Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ, ³SE, Digitális

Egészségtudományi Intézet, ⁴Nemzeti Népegészségügyi Központ, ⁵Országos

Onkológiai Intézet, ⁶Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, ⁷Közép-Kelet

Európai Onkológiai Akadémia

A MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT KORONA-VÍRUS VAKCINÁK HATÉKONYSÁGA ÉS TARTÓSSÁGA 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEKBEN. A HUN-VE 4 VIZSGÁLAT

Kiss Zoltán Dr.,⁽¹⁾ Vokó Zoltán Prof. Dr.,⁽²⁾ Sütő Gábor Prof. Dr.,⁽¹⁾ Molnár Gergely Attila PhD.,⁽¹⁾ Nagy Dávid PhD.,⁽²⁾ Surján György PhD.,⁽³⁾ Surján Orsolya Dr.,⁽⁴⁾ Nagy Péter Prof. Dr.,⁽⁵⁾ Kenessey István PhD.,⁽⁵⁾ Wéber András PhD.,⁽⁵⁾ Pálosi Mihály Dr.,⁽⁶⁾ Müller Cecília Dr.,⁽⁴⁾ Kásler Miklós Prof. Dr.,^(5, 7) Wittmann István Prof. Dr.,⁽¹⁾

¹PTE KK II. Belgyógyászati Klinika, Nephrológiai és Diabetológiai Centrum, ²SE, Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ, ³Institute of Digital Health Sciences, Semmelweis University, Budapest, Hungary, ⁴Nemzeti Népegészségügyi Központ, ⁵Országos Onkológiai Intézet, ⁶Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, ⁷Közép-Kelet Európai Onkológiai Akadémia

A HAZAI DIABÉTESZES LAKOSSÁG INFLUENZA ELLENI ÁTOLTOTT-SÁGÁNAK VIZSGÁLATA AZ EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS ADATBÁZISÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL

Szöllősi Gergő,⁽¹⁾ Pataki Jenifer,⁽¹⁾ Hankovszki András,⁽¹⁾ Kardos László Dr.,⁽²⁾

¹Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Intervenciók Epidemiológia Tanszék,

²Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Biostatistikai és Bioinformatikai Tanszék

10:30 – 11:00 Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. szimpózium
Metformin: a több évtizedes sikertörténet folytatódik
Prof. Dr. Várkonyi Tamás

11:00 – 11:20 Szünet

11:20 – 12:20 Novo Nordisk Hungária Kft. szimpózium I.
Innováció jelentősége a 2-es típusú diabetesz kezelésében
Üléselnök: Prof. Dr. Kempler Péter

Korai agresszív glikémiás kontroll T2DM-ben

Prof. Dr. Hosszúfalusi Nóra

Kardiometabolikus rizikócsökkenés GLP-1 RA kezelés mellett

Prof. Dr. Lengyel Csaba

Új mérőföldkő a T2DM kezelésében

Dr. Molnár Gergő Attila

12:25 – 13:25

AstraZeneca Kft. szimpózium

„Kardio-Renális-Metabolikus forradalom. Ön készen áll?”

Üléselnök: Prof. Dr. Wittmann István

Üléselnöki bevezető

Prof. Dr. Wittmann István

Diabétesz és kardiológiai szövődmények – az életveszélyes páros megelőzése

Dr. Simonyi Gábor

Felismerjük a krónikus vesebetegség valódi veszélyét?

Dr. Dudás Mihály

A diabétesz kezelés modern stratégiája: disease modifying

Prof. Dr. Várkonyi Tamás

13:25 – 14:25

Ebédszünet

14:25 – 15:25

Hetényi emlékelőadás – Dr. Kiss Zoltán

Üléselnökök: Prof. Dr. Wittmann István, Prof. Dr. Várkonyi Tamás

Tamás Gyula emlékelőadás – Dr. Sélley Eszter

Üléselnökök: Prof. Dr. Wittmann István, Prof. Dr. Várkonyi Tamás

15:25 – 16:25

77 Elektronika Kft. szimpózium

Generációkon át

Üléselnök: Prof. Dr. Lengyel Csaba

A folyamatos intersticiális glukózmonitorizálás: elméleti és gyakorlati megfontolások

Prof. Dr. Várkonyi Tamás

Sebességnövelő lépés a telemedicinában. Röviden a bluetooth technológiával kiegészített D-cont® Etalon B vércukormérőről

Dr. Brasnyó Pál

Diabetológia támogatása az EESZT-ben

Szabó Bálint

16:25 – 16:40 Szünet

16:40 – 17:40 Sanofi-Aventis Zrt. szimpózium I.

A második generációs analóg bázisinzulin kezelés optimalizálása

Üléselnök: Prof. Dr. Wittmann István

A diabétesz kezelésének célszervcentrikus megközelítése csökkent vesefunkció esetén

Dr. Molnár Gergő

Evidenciák az céltartományban eltöltött időről 1-es típusú diabéteszben

Dr. Balogh Zoltán

Evidenciák az céltartományban eltöltött időről 2-es típusú diabéteszben

Dr. Keresztes Katalin

17:45 – 18:45 Lilly Hungária Kft. szimpózium I.

Preventív szemlélet vagy a szövődmények kezelése?

Üléselnök: Prof. Dr. Lengyel Csaba

Kerekasztal megbeszélés résztvevői: Prof. Dr. Tomcsányi János, Dr. Dózsa Katalin, Zeley Réka

20:30 – Vacsora

08:00 – 10:00 **Dietetika, edukáció**

Üléselnökök: Dr. Vándorfi Győző, Molnár Ágnes

CUKORBETEGSÉGGEL ÉLŐK DIETETIKAI ELLÁTÁSA A FEKVŐBETEG OSZTÁLYOKON

Kicsák Marian,⁽¹⁾ Gaál Zsolt Dr.,⁽¹⁾

¹SZSZBMK, Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza, IV. Belgyógyászati osztály

A REEDUKÁCIÓ FONTOSSÁGA A DIABÉTESZES BETEGEK KEZELÉSE, GONDOZÁSA SORÁN

Farkas Éva,⁽¹⁾

¹Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórház 3. Belgyógyászat 1. Endokrinológia Osztály, Békéscsaba

DIABÉTESZ EDUKÁTOR TAPASZTALATAIM EGY BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYON

Pogány Krisztina,⁽¹⁾ Noszek Annamária Dr.,⁽¹⁾ Takács József Dr.,⁽¹⁾

¹Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház III. Belgyógyászat és Diabetológiai Szakrendelés

MINDEN ÚT RÓMÁBA VEZET: A FEJLETT HIBRID ZÁRT-HURKÚ INZULINPUMPA RENDSZER OKTATÁSA, ELTÉRÉSEK A KORÁBBI SZENZORRAL ÉRZÉKENYÍTETT PUMPARENDSZEREKHEZ KÉPEST

Csikós Ágnes,⁽¹⁾ Nagy Géza Dr.,⁽¹⁾ Pusztai Péter Dr.,⁽¹⁾ Somogyi Anikó Prof. Dr.,⁽¹⁾ Lukács Krisztina Dr.,⁽¹⁾ Hosszúfalusi Nóra Prof. Dr.,⁽¹⁾ Sármán Beatrix Dr.,⁽¹⁾

¹Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika

SZENZOR TAPASZTALATOK EDUKÁTOR SZEMMEL

Páll Krisztina,⁽¹⁾ Hevesi Judit Dr.,⁽¹⁾ Csik János Dr.,⁽¹⁾ Trendlné Mandl Hajnalka,⁽¹⁾ Baloghné Tékár Hajnalka,⁽¹⁾ Zoboky Barbara,⁽¹⁾

¹Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Járóbeteg Szakrendelő Intézet, Diabetológia Szakrendelés

ÉLET A SZÚRÉS UTÁN

Biriné Mika Borbála,⁽¹⁾ Gaál Zsolt Dr.,⁽¹⁾

¹Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Kórház

TÁPLÁLKOZÁSNAPLÓZÁS HATÁSA AZ INTENZÍV KONVENCIONÁLIS INZULIN TERÁPIÁS BETEGEK METABOLIKUS ÁLLAPOTÁRA

Kiszely Ildikó Dr.,⁽¹⁾ Vágvölgyi Annamária Dr.,⁽¹⁾ Nyiraty Szabolcs Dr.,⁽¹⁾ Szabó Lili Dr.,⁽¹⁾ Lada Szilvia,⁽¹⁾ Szálka Brigitta,⁽⁵⁾ Staberecz Dóra Terézia,⁽¹⁾ Szűcs Mónika,⁽³⁾ Seffer Péter,⁽⁴⁾ Biliczki Vilmos PhD.,⁽⁴⁾ Rafael Beatrix PhD.,⁽⁵⁾ Barnai Marika PhD.,⁽²⁾ Várkonyi Tamás Prof. Dr.,⁽¹⁾ Nemes Attila Prof. Dr.,⁽¹⁾ Kósa István Dr.,⁽⁵⁾ Lengyel Csaba Prof. Dr.,⁽¹⁾

¹Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Belgyógyászati Klinika, ²Szegedi Tudományegyetem, Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Fizioterápiás Tanszék, ³Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, ⁴Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Informatikai Intézet, ⁵Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Preventív Medicina Tanszék

PREKONCEPCIONÁLIS GONDOZÁS ÚTVESZTŐI 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG FENNÁLLÁSAKOR

Tarr Enikő Dr.,⁽¹⁾ Papp Zsuzsanna Dr.,⁽¹⁾ Gaál Zsolt Dr.,⁽¹⁾ Pálffy Zsuzsa Dr.,⁽¹⁾ Kazsu Dorina Dr.,⁽¹⁾ Babják László Dr.,⁽¹⁾ Losonczi Petra Dr.,⁽¹⁾

¹Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Oktatókórház, IV. Belgyógyászati Osztály, Nyíregyháza

11:00 – 11:20 **Szünet**

11:20 – 12:20 **Mölnlycke Health Care Kft. szimpózium**

Oxigénterápia lehetőségei a diabéteszes láb kezelésben

Dr. Kókény Zoltán, Sebkezelő központ – Dr. Kókény Zoltán, Főorvos, sebész szakorvos

Dr. Rozsos István Ph. D. MBA, Théta Egészségközpont, Főorvos, sebész-érsebész szakorvos

12:25 – 13:25 **Teva Gyógyszergyár Zrt. szimpózium**

A diabeteses túl...

Üléselnök: Prof. Dr. Páll Dénes

A hypertonia kezelés aktuális kérdései diabeteses betegeknél

Prof. Dr. Páll Dénes

Kadiometabolikus betegek az infektológus szemével

Dr. Szlávik János

Telemedicina a cukorbeteg és a kardiovaszkuláris betegek ellátásában

Dr. Pilling János

13:25 – 14:25 Ebédszünet

15:25 – 16:25 Medtronic Hungária Kft. szimpózium
**XXI. századi modern technológia nyújtotta megoldások - Lépé-
selőny a T1DM terápiában**
Moderátor: Dr. Kocsis Győző

Melyik szenzort válasszuk betegeink számára?

Dr. Bakó Barnabás

Gyermekek pumpás kezelésének új állomása

Dr. Tóth-Heyn Péter

Minimed 780G pumpával elérhető eredmények és sikerek

Prof. Dr. Hosszúfalusi Nóra

16:25 – 16:40 Szünet

16:40 – 17:40 Roche Magyarország Kft. szimpózium

NT-proBNP - a kardiális HbA1c

Üléselnök: Prof. Dr. Becker Dávid

Megelőzhető-e a manifeszt kardiológiai betegség diabéteszben?

15+5 perc

Dr. Kis János Tibor

Egy praxis gyakorlata 15+5 perc

Dr. Hasitz Ágnes

Diabéteszes beteg a kardiológus szemszögéből 15+5 perc

Prof. Dr. Tomcsányi János

17:45 – 18:45 MSD Pharma Hungary Kft. szimpózium

Hogyan módosult a DPP-4-gátlók helye a klinikai gyakorlatban?

Kerekasztal megbeszélés, a megbeszélést vezeti Prof. Dr. Jermendy

György – Szakértők: Dr. Nádas Judit, Dr. Keresztes Katalin, Dr. Kis János

20:30 – Vacsora

2022. szeptember 10., szombat – Kongresszusi terem

08:30 – 09:30 **Richter Gedeon Nyrt. szimpózium I.**

Professzor kérdez professzort!

Üléselnök: Prof. Dr. Kempler Péter

„Miért ugrál a vérnyomásunk?”

Prof. Dr. Ábrahám György

09:35 – 10:35 **Richter Gedeon Nyrt. szimpózium II.**

Adjunk-e 2023-ban DPP-4 gátlót?”

Üléselnök: Prof. Dr. Kempler Péter

A DPP-4-gátlók helye a 2-es típusú diabetes kezelésében a megújult irányelvek tükrében

Prof. Dr. Jermendy György

Antidiabetikus kezelés speciális helyzetekben- Időskori hypoglycaemia

Dr. Körei Anna

10:35 – 11:00 **Szünet**

11:00 – 13:00 **MDT Közgyűlés II. időpont**

13:00 – 14:00 **Boehringer Ingelheim RCV szimpózium**

Szíve joga – Kerekasztal beszélgetés

Dr. Dósa Ágnes, Prof. Dr. Wittmann István és Dr. Habon Tamás közreműködésével

14:00 – 15:00 **Ebédszünet**

15:00 – 16:00 **Novo Nordisk Hungária Kft. szimpózium II.**

Inzulin generációk

Üléselnök: Dr. Körner Anna

Új generációs terápiás lehetőség a T2DM inzulinkezelésében

Dr. Taybani Zoltán

Generációváltás az analóg bázisinzulin kezelésben

Dr. Sudár Zsolt

Új generációs bólusanalógok

Dr. Kocsis Győző

16:05 – 17:05 Sanofi-Aventis Zrt. szimpózium II.

Egyből kettőt! A GLP-1 RA + BI fix kombinációk helye a klinikai gyakorlatunkban

Üléselnök: Prof. Dr. Várkonyi Tamás

GLP-1 RA + BI fix kombinációkról a CV prevenció törekvések tükrében

Dr. Katona Éva Melitta

GLP-1 RA + BI fix kombinációkról – hogyan tudják kihozni a legjobbat egymásból?

Dr. Nyiraty Szabolcs

17:10 – 18:10 Viatrix szimpózium

A diabéteszesek reziduális kockázatának csökkentése – középpontban a fibrát

Mi van az LDL-C célértékek mögött? Miért kell ismernünk a posztprandiális triglicerid értékeket?

Dr. Reiber István

Fibrát – evidenciák, ajánlások, perspektíva

Prof. Dr. Bajnok László

20:30 – Vacsora

08:30 – 09:30 Lilly Hungária Kft. szimpózium II.

Üléselnök: Prof. Dr. Wittmann István

Minden út az erekhez vezet - hol kezdődik a kardiovaszkuláris kockázatcsökkentés?

Mindenki saját sorsának kovácsa... Mit tehetünk ereink védelmében?

Dr. Földesi Irén

Mindennek van határa... Mit tehetnek a gyógyszerek ereink védelméért?

Dr. Fülöp Gábor

09:35 – 10:35 Civil szervezetek bemutatkozása

Üléselnökök: Prof. Dr. Wittmann István, Prof. Dr. Várkonyi Tamás

Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége

A közösség, amelyhez érdemes tartozni

Füzesi Brigitta, a szövetség elnöke

Egy Csepp Figyelem Alapítvány

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány programjai, diabétesz továbbképzései

Erős Antónia, az alapítvány létrehozója és Gémes Renáta, projekt vezető

Sportos Cukorbeteg Egylete

Bemutatkozik a Sportos Cukorbeteg Egylete

Muskát Erika, az egyesület elnöke

Szurikáta Alapítvány a Diabéteses Gyermekekért

Szurikáták a diabéteszes gyerekekért

Kocsisné Gál Csilla, az alapítvány vezetőke, kuratóriumi elnök

10:35 – 11:00 Szünet

13:00 – 14:00 Magyar Mesterséges Pancreas Munkacsoport

Üléselnökök: Prof. Dr. Barkai László, Prof. Dr. Kovács Levente

T1DM kezelés legnagyobb kihívásai, melyek életre hívták a „csináld magad” DIY mozgalmat

Dr. Kocsis Győző

Csináld magad (DIY) mozgalom terjedése az egyes típusú cukorbetegség kezelése esetén zárt hurkú kezelésnél

Dr. Eigner György

DIY rendszerek technikai, technológiai háttere, kezelési opciók mérnöki szemmel

Novák Kamilla

14:00 – 15:00 Ebédszünet

15:00 – 16:00 Sandoz Hungária Kft. szimpózium

Tartsa szem előtt!

Üléselnök: Prof. Dr. Lengyel Csaba, SZTE Belgyógyászati Klinika, Szeged

Biztonságos állandóság a diabétesz változó világában

Dr. Bódis Beáta, PTE KK - I.sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs

A diabéteszes beteg gondozása és a telemedicina

Dr. Rosta László, Háziiorvosi Szolgálat, Felsőrajk

16:05 – 17:05 Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. szimpózium

Covid-19 és azon túl... Mit tehetünk a megelőzés és a terápia területén?

Diabetes mellitus és SARS-CoV-2, illetve egyéb légúti fertőzések, megelőzés (20 perc prezentáció)

Dr. Habil Hajdú Edit PhD.

Magas rizikójú betegek a COVID megbetegedésben (15 perc prezentáció)

Dr. Schandl László Ph.D. címzetes egyetemi tanár osztályvezető főorvos

Antivirális terápiák a COVID-19 megbetegedés kezelésére (25 perc prezentáció)

Dr. Szlávik János osztályvezető főorvos

17:10 – 18:10 Diabéteszes láb munkacsoport vezetőségválasztás

20:30 – Vacsora

08:15 – 10:00 **Varia**

Üléselnökök: Dr. Kántor Irén, Dr. Rosta László

A XIII-AS VÉRALVADÁSI FAKTOR INTRON-K POLIMORFIZMUSÁNAK G ALLÉLJA VÉDŐ HATÁSÚ A SZUBKLINIKUS ATHEROSCLEROSIS KIALAKULÁSÁBAN

Cogoi Barbara Dr.,⁽¹⁾ Esze Regina,⁽¹⁾ Rajnai Liliána,⁽¹⁾ Somodi Sándor PhD.,⁽¹⁾ H. Shemirani Amir PhD.,⁽²⁾ Bereczky Zsuzsanna PhD.,⁽²⁾ Paragh György Prof. Dr.,⁽¹⁾ Katkó Mónika PhD.,⁽¹⁾ Káplár Miklós PhD.,⁽¹⁾

¹Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet,

²Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Laboratóriumi Medicina Intézet Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék

AZ 1,5-ANHIDROGLUCITOL ÉS A DIABETES MELLITUS ANYAGCSE-REKONTROLL TÖBBI MUTATÓJA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS VIZSGÁLATA

Rácz Olivér Prof. Dr.,^(1,2) Barkai László József Dr. PhD.,^(3,4) Salamonová Blichová Lenka Dr. DPhD.,⁽¹⁾ Sipter Emese Dr.,⁽⁴⁾ Hosszúfalusi Nóra Prof. Dr.,⁽⁴⁾

¹Safarik Egyetem, Orvosi Kar, Kórélettani Intézet, Kassa, Szlovákia., ²Miskolci Egyetem, Egészségtudományi Kar, Miskolc, ³Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest, ⁴Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest

QUO VADIS GDM?

Karászi Gyula Dr.,⁽¹⁾ Bubnó Orsolya Dr.,⁽¹⁾ Albert László Dr.,⁽¹⁾ Gaál Zsolt Dr.,⁽⁴⁾ Pap Károly Dr.,⁽¹⁾

¹Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Oktatókórház, Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Nyíregyháza, ²Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Oktatókórház, Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Nyíregyháza, ³Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Oktatókórház, Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Nyíregyháza, ⁴Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Oktatókórház, IV. Belgyógyászati Osztály, Nyíregyháza, ⁵Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Oktatókórház, Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Nyíregyháza

CUKORBETEGEK GONDOZÁSA SORÁN AZ ISMÉTELT EDUKÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SZÉNHIDRÁT ANYAGCSERÉT JELLEMZŐ VITÁLIS ÉS LABOR PARAMÉTEREK ALAKULÁSÁRA

Hermányi Zsolt Dr.,⁽¹⁾ Majoros Nikolett,⁽²⁾

¹Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetek/Központi Rendelőintézet, Budapest, ²Debreceni Orvostudományi Egyetem/ ÁOK VI. évfolyam, Debrecen

AZ AGYI MIKROKERINGÉS ÉS A CEREBROVASCULÁRIS REAKTIVITÁS VIZSGÁLATA 2-ES TÍPUSÚ DIABETES MELLITUSBAN ÉS OBEZITÁSBAN, A HAPTOGLOBIN POLIMORFIZMUS HATÁSA

Káplár Miklós Dr.,⁽¹⁾ Cogoi Barbara Dr.,⁽¹⁾ Esze Regina Dr.,⁽¹⁾ Rajnai Liliána Dr.,⁽¹⁾ Katkó Mónika Dr.,⁽¹⁾ Képes Zita Dr.,⁽²⁾ Somodi Sándor Dr.,⁽¹⁾ Paragh György Prof. Dr.,⁽¹⁾ Emri Miklós Dr.,⁽³⁾ Garai Ildikó Dr.,⁽²⁾

¹Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen, ²ScanoMed Kft, Debrecen, ³Debreceni Egyetem, Nukleáris Medicina Intézet, Debrecen

SÚLYOS LÁBSZÖVŐDMÉNNYEL RENDELKEZŐ, MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ BETEGEK DIABÉTESZES EDUKÁCIÓJÁNAK SAJÁTOSÁGAI

Popovicsné Bakai Ildikó,⁽¹⁾ Ambró Ágnes PhD.,⁽¹⁾ Szabó Zita,⁽¹⁾ Farkas Péter Dr.,⁽¹⁾

¹OMINT-OORI Szeptikus Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály

AZ ALSÓ VÉGTAG ELVESZTÉSÉNEK KOCKÁZATÁVAL ÉLŐ CUKORBETEGEK ÉS/VAGY PERIFÉRIÁS VERŐÉRBETEGEK KOMPLEX SZŰRÉSÉVEL NYERT TAPASZTALATAINK AZ ALAPELLÁTÁSBAN.

Kajetán Miklós Dr.,^(1,2) Antalics Gábor Dr.,^(3,4) Vörös Krisztián Dr.,⁽⁴⁾ Dina Márton Dr.,⁽³⁾ Brichter Edit,⁽¹⁾

¹Strázsahegy Medicina Háziorvosi Rendelő, ²Diabéteszes Láb Ambulancia Bajcsy-Zsilinszky Kórház, ³Hegyi Doktor Kft Családorvosi Rendelője, ⁴Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék

10:00 – 11:15

Diabétesz és kardiovaszkuláris állapot

Üléselnökök: Dr. Hidvégi Tibor, Dr. Molnár Gergő Attila

A SZÉRUM AFAMIN KORRELÁL A SZÉNHYDRÁT PARAMÉTEREKKEL ÉS LIPOPROTEIN SZUBFRAKCIÓKKAL ELHÍZOTT 2-ES TÍPUSÚ DIABETESES ÉS NEM DIABETESES BETEGEKBEN

Lőrincz Hajnalka Dr.,⁽¹⁾ Ratku Balázs,⁽²⁾ Ötvös Tamás Dr.,⁽²⁾ Szentpéteri Anita Dr.,⁽¹⁾ Seres Ildikó Dr.,⁽¹⁾ Katona Éva Dr.,⁽¹⁾ Páll Dénes Prof. Dr.,⁽¹⁾ Paragh György Prof. Dr.,⁽¹⁾ Harangi Mariann Dr.,⁽¹⁾ Somodi Sándor Dr.,⁽²⁾
¹Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere betegségek Tanszék, Debrecen, ²Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sürgősségi Orvostani Tanszék, Debrecen

ANGIOPÁTHIA ÉS NEUROPÁTHIA VIZSGÁLATA DIABÉTESZES BETEGEKBEN NON-INVAZÍV ANGIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKA SEGÍTSÉGÉVEL

Bíró Katalin Dr.,⁽¹⁾ Farkas Viktor András,⁽¹⁾ Koltai Katalin Dr.,⁽¹⁾ Fendrik Krisztina Dr.,⁽¹⁾ Endrei Dóra Dr.,⁽¹⁾ Késmárky Gábor Prof. Dr.,⁽¹⁾ Tóth Kálmán Prof. Dr.,⁽¹⁾

¹PTE KK I. sz Belgyógyászati Klinika, Pécs

HÁROM-DIMENZIÓS SPECKLE-TRACKING ECHOKARDIOGRÁFIÁVAL VIZSGÁLT JOBB PITVAR VOLUMETRIKUS ÉS FUNKCIONÁLIS JELLEMZŐI FIATAL 1-ES TÍPUSÚ DIABETES MELLITUSOS BETEGEKBEN

Nemes Attila Prof. Dr.,⁽¹⁾ Kormányos Árpád Dr.,⁽¹⁾ Ruzsa Zoltán Dr.,⁽¹⁾ Várkonyi Tamás Prof. Dr.,⁽¹⁾ Lengyel Csaba Prof. Dr.,⁽¹⁾

¹Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Klinika

KARDIOVASZKULÁRIS KOCKÁZAT KORAI KEZDETŰ ÉS HOSSZÚ BETEGSÉGTARTAMÚ 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉGBEN: NAGY RIZIKÓ – KEVÉS FIGYELEM

Ambrus Viktória Dr.,⁽¹⁾ Vida Ádám Dr.,⁽¹⁾ Somogyi Anikó Prof. Dr.,⁽¹⁾ Sárman Beáta Dr.,⁽¹⁾ Nagy Géza Dr.,⁽¹⁾ Herold Magdolna,⁽¹⁾ Hosszúfalusi Nóra Prof. Dr.,⁽¹⁾ Sipter Emese Dr.,⁽¹⁾

¹Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinika

TÚLSÚLYCSÖKKENTŐ SEBÉSZET – NEM CSAK ESZTÉTIKA

Juhász Árpád Dr. PhD.,⁽¹⁾

¹Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Egyetemi Oktató Kórház, Általános- és Mellkassebészeti Osztály

11:15 – 11:30

Szünet

Üléselnökök: Prof. Dr. Hosszúfalusi Nóra, Prof. Dr. Várkonyi Tamás

METABOLIKUS SZINDRÓMA JELLEMZŐI 2010-2021 KÖZT MAGYARORSZÁG ÁTFOGÓ EGÉSZSÉGVÉDELMI SZŰRŐPROGRAMJÁBAN (MAESZ)

Barna István Dr.,⁽¹⁾ Kékes Ede Prof. Dr.,⁽²⁾ Tenno Daiki,⁽³⁾ Dankovics Gergely,⁽⁴⁾

¹Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, ²MÁESZ Program, Szakmai Programbizottság elnökségi tag, Pécs, ³ELTE, Média és Oktatásinformatikai Tanszék, Budapest, ⁴MÁESZ Program, Programigazgató, Szentendre

A VÁRANDÓSÁGI CUKORBETEGSÉG ELŐFORDULÁSÁNAK ÉS KEZELTSÉGÉNEK AZ ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2009 ÉS 2019 KÖZÖTT - POPULÁCIÓS SZŰRŐVIZSGÁLAT

Kun Attila PhD.,⁽¹⁾ Vizsolyi Gergely Á. Dr.,^(2, 3, 4) Svébis Márk M. Dr.,^(3, 4) Tabák Gy. Ádám PhD.,^(4, 5, 6)

¹Szülészeti-Nőgyógyászati Szakrendelés, Paksi Gyógyászati Központ, Paks, ²Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest, ³Rácz Károly Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola, Semmelweis Egyetem, Budapest, ⁴Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest, ⁵Epidemiológiai és Népegészségtani Tanszék, University College London, London, Egyesült Királyság, ⁶Népegészségtani Intézet, Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest

A HÁZIORVOSI PREVENCIÓS RENDELÉS JELENTŐSÉGE A DIABETES BETEGEK ELLÁTÁSÁBAN

Galvács Henrietta Dr.,^(1, 2) Mongel Istvánné,⁽²⁾ Dózsa Katalin Dr.,⁽²⁾

¹Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, ²MedProFam Háziiorvosi Szolgáltató Kft.

BIZONYÍTÉK ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK A 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK HÁZIORVOSI ELLÁTÁSÁBAN

Dózsa Katalin Mária Dr.,⁽¹⁾ Oláh Ilona Dr.,⁽²⁾

¹Háziiorvosi rendelő, Páty, ²Háziiorvosi Rendelő, Budapest-Csepel, ³Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék, ⁴Háziiorvosi Rendelő, Felsőrajk, ⁵Semmelweis Egyetem Ápolástan Tanszék, ⁶Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati és Onkológiai Klinika

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERREL VALÓ ELÉGEDETTSÉG FELMÉRÉSE A HAZAI CUKORBETEG LAKOSSÁG KÖRÉBEN A 2009-2019-ES EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS ALAPJÁN

Hankovszki András Dávid,⁽¹⁾ Pataki Jenifer,⁽¹⁾ Szöllősi Gergő József,⁽¹⁾

¹Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Intervenció Epidemiológia Tanszék

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL ELŐFORDULÁSI GYAKORISÁGA, ILLETVE A SZŰRÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL HÁTTERÉBEN ÁLLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA A HAZAI DIABÉTESZES LAKOSSÁG KÖRÉBEN

Pataki Jenifer,⁽²⁾ Hankovszki András Dávid,⁽¹⁾ Szöllősi Gergő József,⁽¹⁾

¹Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Intervenció Epidemiológia Tanszék, Debrecen,

²Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Rehabilitációs Medicina Tanszék, Debrecen

13:00 – 14:00 **Diabétesz gondozás**

Üléselnökök: Dr. Körner Anna, Prof. Dr. Gerő László

BELÉPŐ HBA1C ALAPJÁN MELY BETEGPULÁCIÓ PROFITÁL LEGTÖBBET A FOLYAMATOS SZÖVETI GLÜKÓZ MONITORIZÁLÁS BEVEZETÉSÉBŐL?

Jávorfí Tamás Dr.,⁽¹⁾ Garam Nóra Dr.,⁽¹⁾ Svébis Márk Dr.,⁽¹⁾ Tóth Beatrix,⁽¹⁾ Ferenci Tamás Dr.,⁽²⁾ Eigner György,⁽²⁾ Siket Máté,⁽²⁾ Dénes-Fazekas Lehel,⁽²⁾ Kocsis Győző Dr.,⁽¹⁾

¹Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, ²Óbudai Egyetem

A HBA1C MEGHATÁROZÁS KORLÁTAI-EGY ESETÜNK BEMUTATÁSA

Gaál Zsolt Dr.,⁽¹⁾ **Pálffy Zsuzsa Dr.,**⁽¹⁾ Kazsu Dorina Dr.,⁽¹⁾ Tarr Enikő Dr.,⁽¹⁾

¹Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Oktatókórház, IV. Belgyógyászati osztály

HAT, EGY PRAXISON BELÜL HOSSZÚ TÁVON GONDOZOTT 50 ÉV FELETTI DIABETES TARTAMMAL RENDELKEZŐ BETEG ESETÉNEK LONGITUDINÁLIS ÉS KERESZTMETSZETI ELEMZÉSE

Fővényi József PhD.,⁽¹⁾ Greschik István Dr.,⁽²⁾ Jermendy Ádám PhD.,⁽³⁾ Kocsis Győző Dr.,⁽⁴⁾

¹Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet, Diabetes Szakrendelő, ²Pest Megyei Flór Ferenc Kórház III. Belgyógyászati Osztály Kardiológia, ³Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, ⁴Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika

A CGMS SZEREPE A HYPOGLYKAEMIÁK AZONOSÍTÁSÁBAN, A DIAGNÓZISBAN ÉS A TERÁPIA SIKERÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁBAN

Kazu Dorina Dr.,⁽¹⁾ Papp Zsuzsanna Dr.,⁽¹⁾ Tarr Enikő Dr.,⁽¹⁾ Losonczy Petra Dr.,⁽¹⁾ Pálffy Zsuzsa Dr.,⁽¹⁾ Babják László Dr.,⁽¹⁾ Zemanek Péter Dr.,⁽²⁾ Gaál Zsolt Dr.,⁽¹⁾

¹IV. Belgyógyászat, Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza, ²Sebészeti Osztály, Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza

14:00 – 14:10 Kongresszus zárása

14:10 – Ebéd

08:15 – 10:00 Személyre szabott terápia

Üléselnök: Dr. Petró Gizella, Dr. Taybani Zoltán

DIABÉTESZ VILÁGNÉZETEM - A MEGFELEŐ GYÓGYSZERT A MEGFELEŐ BETEGNEK

Takács József Dr.,⁽¹⁾ Noszek Annamária Dr.,⁽¹⁾

¹Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház III. Belgyógyászat és Diabetológiai Szakrendelés

REVISIO - DIABETOLÓGIAI AMBULANCIÁNKON GONDOZOTT BETEGEINK ADATAINAK ELEMZÉSE

Noszek Annamária Dr.,⁽¹⁾ Gábora Sára,⁽¹⁾ Kovács Istvánné,⁽¹⁾ Oláh Elvira,⁽¹⁾ Pogány Krisztina,⁽¹⁾ Takács József Dr.,⁽¹⁾

¹Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház III. Belgyógyászat és Diabetológiai Szakrendelés

LABOR PARAMÉTEREK VÁLTOZÁSA MOBILTELEFONNAL TÁMOGATOTT ÉLETMÓDI INTERVENCIÓ KAPCSÁN METABOLIKUS SZINDRÓMÁS BETEGEKBEN

Ábrahám Judit Dr.,⁽¹⁾ Kiszely Ildikó Dr.,⁽²⁾ Szabó Lili Dr.,⁽²⁾ Máthéné Köteles Éva,⁽³⁾ Lada Szilvia,⁽²⁾ Szálka Brigitta,⁽¹⁾ Korom Andrea,⁽³⁾ Staberecz Dóra Terézia,⁽²⁾ Szűcs Mónika,⁽⁴⁾ Seffer Péter,⁽⁴⁾ Biliczki Vilmos PhD.,⁽³⁾ Rafael Beatrix PhD.,⁽¹⁾ Barnai Mária PhD.,⁽³⁾ Várkonyi Tamás Prof. Dr.,⁽²⁾ Nemes Attila Prof. Dr.,⁽²⁾ Lengyel Csaba Prof. Dr.,⁽²⁾ Kósa István Dr.,^(1, 2)

¹Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Preventív Medicina Tanszék, ²Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Belgyógyászati Klinika, ³Szegedi Tudományegyetem, Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Fizioterápiás Tanszék, ⁴Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, ⁵Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Informatikai Intézet

MOBILTELEFONNAL TÁMOGATOTT ÉLETMÓDI INTERVENCIÓ HATÁSA METABOLIKUS SZINDRÓMÁS BETEGEK FIZIOLÓGIAI PARAMÉTEREIRE

Máthéné Köteles Éva,⁽¹⁾ Kiszely Ildikó Dr.,⁽²⁾ Szabó Lili Dr.,⁽¹⁾ Lada Szilvia,⁽¹⁾ Szálka Brigitta,⁽⁵⁾ Korom Andrea,⁽¹⁾ Staberecz Dóra Terézia,⁽²⁾ Ábrahám Judit Dr.,⁽⁵⁾ Szűcs Mónika,⁽³⁾ Seffer Péter,⁽⁴⁾ Biliczki Vilmos PhD.,⁽⁴⁾ Rafael Beatrix PhD.,^(5, 2) Barnai Mária PhD.,⁽¹⁾ Várkonyi Tamás Prof. Dr.,⁽²⁾ Nemes Attila Prof. Dr.,⁽²⁾ Lengyel Csaba Prof. Dr.,⁽²⁾ **Kósa István Dr.,^(5, 2)**

A KOMBINÁLT ANTIDIABETIKUM KEZELÉS KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT ALKALMAZOTT GLP-1-RA, ILLETVE SGLT-2 INHIBITOR KEZELÉS HOSSZÚ TÁVÚ HATÉKONYSÁGA 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEKBEN

Fülöp Gábor Dr.,⁽¹⁾ Dezső László Dr.,⁽¹⁾ Wittmann István Prof. Dr.,⁽¹⁾

¹PTE KK. II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum, Pécs

AZ IDEGLIRÁVAL VÉGZETT KORAI DEESZKALÁCIÓ HATÉKONYSÁGA ÉS BIZTONSÁGOSSÁGA A KIFEJEZETT HYPERGLYKAEMIA MIATT RÖVID IDEIG INTENZÍV INZULINKEZELÉST ALKALMAZÓ 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEKBEN

Taybani Zoltán Dr.,⁽¹⁾ Bótyik Balázs Dr.,⁽¹⁾ Veres Agneta Dr.,⁽¹⁾ Fehér-templomi Katalin Dr.,⁽¹⁾ Zatykó Máté Dr.,⁽¹⁾ Szerencsi Regina Dr.,⁽¹⁾ Csatári Gergő Dr.,⁽¹⁾ Gécz Barnabás Dr.,⁽¹⁾ Katkó Mónika PhD.,⁽²⁾ Várkonyi Tamás Prof. Dr.,⁽³⁾

¹Békés Megyei Központi Kórház, Dr. Réthy Pál Tagkórház, 3. Belgyógyászat, 1. Endokrinológia, Békéscsaba, ²Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Debrecen, ³Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar, I. Belgyógyászati Klinika, Szeged

A DEESZKALÁCIÓ KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGI KÉRDÉSEI KLINIKAI ADATOK ALAPJÁN

Bencsik Nóra Dr.,^(1,2) Bibok György Dr.,⁽²⁾

¹Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat, Diabetológia Szakrendelés, ²Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Diabetológia Szakrendelés

10:00 – 11:15

TIDM II.

Üléselnökök: Dr. Kocsis Győző, Dr. Blatniczky László

FEHÉRJÉK POSZTTTRANSLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSÁNAK SZEREPE 1-ES TÍPUSÚ DIABETES MELLITUSBAN

Kupai Krisztina Dr.,⁽²⁾ Török Szilvia,⁽¹⁾ Várkonyi Ákos,⁽²⁾ Csonka Ákos Dr.,⁽³⁾ Almási Nikoletta Dr.,⁽¹⁾ Várkonyi Tamás Prof. Dr.,⁽²⁾ Lengyel Csaba Prof. Dr.,⁽²⁾ Valkusz Zsuzsanna Dr.,⁽²⁾ Pósa Anikó Dr.,⁽¹⁾ Varga Csaba Dr.,⁽¹⁾

¹SZTE TTIK, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, Szeged, ²Szegedi Tudományegyetem, Belgyógyászati Klinika, Szeged, ³Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Szeged, Traumatológiai Klinika

A MINIMED 780G INZULINPUMPARENDSZER ANYAGCSERÉRE GYAKOROLT HATÁSA (VALÓS IDEJŰ SZÖVETI GLÜKÓZMÉRÉssel KÖVETVE) ALCSOPORT ELEMZÉS A BELÉPŐ TIR(STRANDARIZÁLT VÉRCUKORTRATOMÁNYOK SZERINTI CÉLTARTOMÁNY) ELTÖLTÖTT IDŐ ALAPJÁN – MELYIK BETEG POPULÁCIÓ PROFITÁL A LEGTÖBBET A KEZELÉSI BEVEZETÉSÉBŐL?

Kocsis Győző Dr.,⁽¹⁾ Garam Nóra Dr.,⁽¹⁾ Jávorfi Tamás Dr.,⁽¹⁾ Svébis Márk Dr.,⁽¹⁾ Tóth Beatrix,⁽¹⁾ Ferenczi Tamás Dr.,⁽²⁾ Siket Máté,⁽²⁾ Fazakas-Dénes Lehel,⁽²⁾ Eigner György,⁽²⁾

¹Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, ²Óbudai Egyetem

INZULINPUMPA KEZELÉS, FOLYAMATOS VÉRCUKOR MONITOROZÁS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A HAGYOMÁNYOS UJJBEGYES VÉRCUKORMÉRÉSSSEL ÉS INTENZIFIKÁLT INZULINKEZÉSSSEL 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEG KISMAMÁK ÉS ÚJSZÜLÖTTJEIK KÖRÉBEN

Sármán Beatrix Dr.,⁽¹⁾

¹Semmelweis Egyetem, ÁOK, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika

A MINIMED 780G INZULINPUMPARENDSZER ANYAGCSERÉRE GYAKOROLT HATÁSA (VALÓS IDEJŰ SZÖVETI GLÜKÓZMÉRÉssel KÖVETVE)

Svébis Márk Dr.,⁽¹⁾ Jávorfi Tamás Dr.,⁽¹⁾ Garam Nóra Dr.,⁽¹⁾ Tóth Beatrix,⁽¹⁾ Ferenci Tamás Dr.,⁽²⁾ Eigner György Dr.,⁽²⁾ Siket Máté,⁽²⁾ Dénes-Fazekas Lehel,⁽²⁾ Kocsis Győző Dr.⁽¹⁾

¹Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest, ²Óbudai Egyetem, Budapest

11:15 – 11:30 Szünet

11:30 – 13:00 A diabetes tipizálásának és genetikai háttérének kérdései

Üléselnökök: Dr. Fülöp Gábor, Dr. Gaál Zsolt

GONDOLATOK AZ INZULINREZISZTENCIA ÉS A BÉTA-SEJTEK DISZFUNKCIÓJÁRÓL A KETTES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG ÚJ OSZTÁLYOZÁSA KAPCSÁN

Fraenkel Emil PhD.,⁽¹⁾ Brenišin Marek PhD.,⁽²⁾ Rácz Olivér Prof. Dr.,^(2,3)

¹1. sz. Belgyógyászati Klinika, L. Pasteur Egyetemi Kórház, Safárik Egyetem, Orvosi Kar, Kassa, Szlovákia, ²Kórélettani Intézet, Safárik Egyetem, Orvosi Kar, Kassa, Szlovákia, ³Egészségtudományi Kar, Miskolci Egyetem, Miskolc

HÁROMBÓL EGY FELNŐTTKORI KETÓZISSAL KEZDŐDŐ CUKORBETEGSÉG HÁTTÉRÉBEN NEM 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG ÁLL: METAANALÍZIS

Kovács Adrienn Dr.,⁽¹⁾ Bunduc Stefania Dr.,⁽²⁾ Veres Dániel Sándor Dr.,⁽³⁾ Pálinskás Dániel Dr.,⁽⁴⁾ Gagy Endre Botond Dr.,⁽²⁾ Márta Katalin Dr.,⁽²⁾ Hegyi Jenő Péter Dr.,⁽²⁾ Erőss Bálint Dr.,⁽²⁾ Mihály Emese Dr.,⁽¹⁾ Sipter Emese Dr.,⁽¹⁾ Pánczél Pál Prof. Dr.,⁽¹⁾ Hegyi Péter Prof. Dr.,⁽²⁾ Hosszúfalusi Nóra Prof. Dr.,⁽¹⁾

¹SE Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest, ²SE Transzlációs Medicina Központ, Budapest, ³SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Budapest, ⁴Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest

MAGYAR MÓDY PÁCIENSEK ADATAINAK ELEMZÉSE

Gaál Zsolt Dr.,⁽¹⁾ Zsuzsanna Szűcs Dr.,⁽²⁾ Kántor Irén Dr.,⁽³⁾ Andrea Luczay Dr.,⁽⁴⁾ Péter Tóthy-Heyn Dr.,⁽⁴⁾ Benn Orsolya Dr.,⁽⁵⁾ Felszeghy Enikő Dr.,⁽⁶⁾ Karádi Zsuzsanna Dr.,⁽⁵⁾ Madar László Dr.,⁽²⁾ Balogh István Dr.,⁽²⁾

¹Jósa András Oktatókórház IV.Belgyógyászat Nyíregyháza, ²Debreceni Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet Klinika Genetikai Tanszék, ³Jósa András Oktatókórház Gyermekosztály Nyíregyháza, ⁴Semmelweis Egyetem I.Gyermekklinika Budapest, ⁵Szent György Kórház Gyermekosztály Székesfehérvár, ⁶Debreceni Egyetem Gyermekklinika

A TCF7L2, WFS1 ÉS 11BHS1 KOCKÁZATI GÉNVARIÁNSOK ÉS A HASNYÁLMIRIGY LIPIDTARTALOM EGYÜTTES HATÁSA A B-SEJT FUNKCIÓRA KÖZÉPKORÚ NŐKBEN

Nádasdi Ákos Dr.,⁽¹⁾ Gál Viktor Dr.,⁽²⁾ Masszi Tamás Prof. Dr.,⁽¹⁾ Patócs Attila Prof. Dr.,^(3,4) Igaz Péter Prof. Dr.,^(5,6,7) Somogyi Anikó Prof. Dr.,⁽¹⁾

Firneisz Gábor Dr.,⁽⁵⁾

¹Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Általános Orvostudományi Kar, Semmelweis Egyetem, Budapest, ²Agyi Képző Központ, Természettudományi Kutatóközpont, Eötvös Lóránd Kutatói Hálózat, Budapest, ³MTA-SE Örökletes Daganatok Kutatócsoport, Eötvös Lóránd Kutatói Hálózat, Budapest, ⁴Laboratóriumi Medicina Intézet, Laboratóriumi Medicina Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest, ⁵MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport, Eötvös Lóránd Kutatói Hálózat, Budapest, ⁶Endokrinológiai Tanszék, Általános Orvostudományi Kar, Semmelweis Egyetem, ⁷Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Általános Orvostudományi Kar, Semmelweis Egyetem, Budapest

A DIABÉTESZES NEUROPÁTIA KIALAKULÁSÁNAK A KOCKÁZATÁT FOKOZÓ GENETIKAI TÉNYEZŐK

Tordai Dóra,⁽¹⁾ Hajdú Noémi,⁽¹⁾ Vági Orsolya Erzsébet,⁽¹⁾ Kempler Miklós,⁽²⁾ Békeffy Magdolna,⁽¹⁾ Körei Anna Erzsébet,⁽¹⁾ Istenes Ildikó,⁽¹⁾ Horváth Viktor,⁽¹⁾ Kempler Péter,⁽¹⁾ Putz Zsuzsanna⁽¹⁾

¹Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, ²Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinika

A DIABÉTESZES NEUROPÁTIA KOCKÁZATÁT CSÖKKENTŐ GENETIKAI TÉNYEZŐK

Hajdú Noémi,⁽¹⁾ Tordai Dóra,⁽¹⁾ Vági Orsolya Erzsébet,⁽¹⁾ Kempler Miklós,⁽²⁾ Békeffy Magdolna,⁽¹⁾ Körei Anna Erzsébet,⁽¹⁾ Istenes Ildikó,⁽¹⁾ Horváth Viktor,⁽¹⁾ Kempler Péter,⁽¹⁾ Putz Zsuzsanna⁽¹⁾


¹Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, ²Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinika

14:00 – 14:10 **Kongresszus zárása**

14:10 – **Ebéd**


T.I.K. – ÁTRIUM

1. 77 ELEKTRONIKA
2. ASTRAZENECA
3. SANOFI
4. BOEHRINGER
5. DI-CARE
6. ROCHE
7. RICHTER
8. MEDTRONIC
9. BERLIN-CHEMIE
10. SANDOZ
11. LILLY
12. MEDCORDIS
13. WÖRWAG
14. MERCK
15. NOVO NORDISK



T.I.K. – FÖLDSZINT

1. PFIZER
2. MÖLNLYCKE
3. TEVA
4. ZENTIVA
5. VIATRIS
6. EXTRACTUM PHARMA
7. SERVIER
8. SYNEXUS
9. FÜSTMENTES
10. MDT STAND



EGYSZERŰ ÉS HATÁSOS¹

B12-vitamin terápia



A B12-VITAMIN-HIÁNY
GYAKORISÁGA
**METFORMIN-
KEZELTEKNÉL
AKÁR?:**

30%



**NAGY
DÓZIS!**

B12-VITAMIN ANKERMANN®

Az Amerikai Diabetes Társaság (ADA) szakértői testülete a B12-vitamin-szint periodikus ellenőrzését ajánlja metforminnal kezelt betegeknél, a hiány pótlására pedig 1000 µg/nap dóziszú per os terápiát javasol.²

¹Gerő L. B12-vitamin-hiány a diabetológus szemzőgéből: lehetséges okok, klinikai következmények és kezelés. című cikk alapján szerkesztett állítás. Diabetologia Hungarica 2020; 28(1): 23-32. DOI: 10.24121/dh.2020.3

²Pop-Busui et al. Diagnosis and Treatment of Painful Diabetic Peripheral Neuropathy. ADA Clinical Compendia Series, 2022.

B12-vitamin AnkerMann® 1000 mikrogramm bevonat tabletta (50x, 100x) rövidített alkalmazási előírás:

Terápiás javallatok: B12-vitaminhiány kezelésére, különösen olyan betegeknél, akik szigorúan vegetáriánusok vagy vegán étrenden élnek vagy B12-vitamin malabszorpciójuk van. **Adagolás és alkalmazás:** **Felnőttek:** napi 1 tabletta. **Gyermekek és serdülők:** Legfeljebb napi 1 tabletta a B12-vitaminhiány parenterális alkalmazásának alternatívájaként. 6 évesnél fiatalabb gyermekeknek nem ajánlott. A tablettát egészben kell lenyelni elegendő mennyiségű vízzel, lehetőleg reggel, éhgyomorra. **Ellenjavallatok:** Ismert, cianokobalammal vagy bármelyik segédanyaggal szembeni túlérzékenység. Nem szabad olyan betegeknél alkalmazni, akiknek cianid detoxikációra van szükségük (pl. dohányzás okozta amblyopia vagy retrobulbaris neuritis anaemia perniciosa). Ebben az esetben más kobalamid származékokat kell alkalmazni. B12-vitaminhiányban szenvedő egyéneknek, akiknél fennáll a Leber-féle optikus atrófia rizikója, nem szabad cianokobalaminat adni a B12-vitaminhiány kezelésére. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** A következő reakciókat többnyire parenterális alkalmazás során jegyezték fel: Nem gyakori: Súlyos túlérzékenységi reakciók, amelyek csalánkiütés, a test nagy területeinek bőrkütsége, vagy viszketés formájában manifesztálódnak. **Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések:** Az erős dohányzás inaktíválja a B12-vitamint. Károsodott májműködésű és vesefunkciójú betegeknél orvosi konzultáció nélkül nem szabad alkalmazni. **Kiadhatóság:** Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer (VN). A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2018.05.16. **A szöveg ellenőrzésének dátuma:** 2021.10.18.

A B12-vitamin AnkerMann® 1000 µg bevonat tabletta nem részesül társadalombiztosítási támogatásban, ezért ára patikánként eltérő lehet. Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását: www.ogyei.gov.hu
Wörwag Pharma Kft. 1037 Bp., Montevideo u. 5. Tel: (1)345-7350, woerwagpharma.hu, info@woerwagpharma.hu, mellekhatas@woerwagpharma.hu, B12/H/2022-16 Lezárás dátuma: 2022.05.31.



ÉBRESSZE RÁ BETEGEIT AZ ÚJ LEHETŐSÉGRE

RYBELSUS® ▼ **kezeléssel**
2-es típusú felnőtt cukorbetegnekél:



Szuperior HbA_{1c} csökkentés vs. szitagliptin és empagliflozin^{1,3,4}



Testsúlycsökkenés látható előnye akár 4,3 kg^{1,2}



Kardiometabolikus rizikófaktorok csökkentése¹

RYBELSUS®
szemaglutid tabletta

▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

A GYÓGYSZER NEVE: RYBELSUS® 3 mg tabletta, RYBELSUS® 7 mg tabletta, RYBELSUS® 14 mg tabletta.

MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: RYBELSUS® 3 mg tabletta: tablettánként 3 mg szemaglutidot* tartalmaz. RYBELSUS® 7 mg tabletta: tablettánként 7 mg szemaglutidot* tartalmaz. RYBELSUS® 14 mg tabletta: tablettánként 14 mg szemaglutidot* tartalmaz.
*humán glükagonserű peptid-1-analóg (GLP-1-analóg), rekombináns DNS-technológiával Saccharomyces cerevisiae sejtekben előállítva.

GYÓGYSZERFORMA: Tabletta. RYBELSUS® 3 mg tabletta: Fehér vagy világossárga, ovális alakú tabletta (7,5 mm × 13,5 mm), az egyik oldalán „3”, a másik oldalán „novo” mélynyomású jelzéssel. RYBELSUS® 7 mg tabletta: Fehér vagy világossárga, ovális alakú tabletta (7,5 mm × 13,5 mm), az egyik oldalán „7”, a másik oldalán „novo” mélynyomású jelzéssel. RYBELSUS® 14 mg tabletta: Fehér vagy világossárga, ovális alakú tabletta (7,5 mm × 13,5 mm), az egyik oldalán „14”, a másik oldalán „novo” mélynyomású jelzéssel.

A készítmény rendelkezése előtt kérjük, olvassa el a hatályos teljes alkalmazási előírást!



A hatályos alkalmazási előírás teljes szövege megtalálható az Európai Gyógyszerügynökség honlapján:

<https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/rybelsus#product-information-section>

Megjegyzés: A QR kód a készítmény oldalára mutat. A magyar nyelvű alkalmazási előírás ezen az oldalon a Product information szakasz első lenyíló listájában (Available languages), a Hungarian szóra kattintva érhető el.

Feltételezett mellékhatások bejelentése: A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére

az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest; honlap: www.ogyei.gov.hu.

TÁMOGATÁSSAL ÉS ÁRRAL, VALAMINT A RENDELHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ:

A RYBELSUS® 3 mg tabletta, a RYBELSUS® 7 mg tabletta és a RYBELSUS® 14 mg tabletta osztályozási besorolása: „V” – orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer. Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! A RYBELSUS® 3 mg tabletta gyógyszerkészítmény bruttó fogyasztói ára: 36 071 Ft, tb-támogatás: 25 250 Ft, térítési díj: 10 821 Ft. 70 1. pont szerinti rendelés esetén. A RYBELSUS® 7 mg tabletta és a RYBELSUS® 14 mg tabletta gyógyszerkészítmény bruttó fogyasztói ára: 39 407 Ft, tb-támogatás: 27 585 Ft, térítési díj: 11 822 Ft. 70 1. pont szerinti rendelés esetén.

A készítmény 2022. május 1-től hatályos NEAK ár- és támogatási adatai alapján.

Referencia: 1. RYBELSUS® alkalmazási előírás 2. Pratley R, Amod A, Hoff ST, et al. Oral semaglutide versus subcutaneous liraglutide and placebo in type 2 diabetes (PIONEER 4): a randomised, double-blind, phase 3a trial. Lancet. 2019;394(10192):39-50. 3. Rosenstock J, Allison D, Birkenfeld AL, et al. Effect of additional oral semaglutide vs sitagliptin on glycated hemoglobin in adults with type 2 diabetes uncontrolled with metformin alone or with sulfonylurea: the PIONEER 3 randomized clinical trial. JAMA. 2019;321(15):1466-1480. 4. Rodbard HW, Rosenstock J, Canani LH, et al. Oral semaglutide versus empagliflozin in patients with type 2 diabetes uncontrolled on metformin: the PIONEER 2 trial. Diabetes Care. 2019;42(12):2272-2281.

A RYBELSUS® a Novo Nordisk A/S, Dánia védjegye.

© 2022 Novo Nordisk A/S
HU22RYB00019 | 2022-07-25



Novo Nordisk Hungária Kft. | 1117 Budapest, Buda-part tér 2.

Tel: 06-1-325-9161, fax: 06-1-325-9169 | www.novonordisk.hu

Mellékhatás-jelentés esetén: safety-hu@novonordisk.com

RYBELSUS®
szemaglutid tabletta

Benfogamma®

300 mg filmtabletta 30x
benfotiamin

Benfotiamin a Wörwag Pharmától.

B1-vitamin-hiány okozta neuropathiák és
cardiovascularis betegségek kezelésére ajánlott.¹



Közgyógyellátás
terhére is felírható!

Benfogamma® 300 mg filmtabletta 30x

Hatóanyag: benfotiamin. **ATC kód:** A11DA03. **Terápiás javallatok:** B1-vitaminhiány okozta neuropathiák és cardiovascularis betegségek kezelésére. Klinikai B1-vitaminhiányos állapotok kezelése, ha ezeket étrendi eszközökkel nem lehet megoldani. **Adagolás és alkalmazás:** Naponta 1x1 filmtabletta. Az alkalmazás időtartama a terápia eredményességétől függ. Neuropathiák kezelésére kezdetben legalább 3 hétig kell szedni, ezután a fenntartó kezelést a terápiás válaszhoz kell igazítani. Abban az esetben, ha a terápiás válasz 4 hét után hiányzik vagy nem kielégítő, a terápiát felül kell vizsgálni. **Ellenjavallatok:** A készítmény hatóanyagával, tiaminnal, vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** Nagyon ritka: túlérzékenységi reakciók (urticaria, exanthema); gastrointestinalis zavarok (pl. hányás), melyek gyakorisága nem különbözött szignifikánsan a placebóval kezelt csoporttól. A benfotiaminnal való oki összefüggés nem kielégítően tisztázott, és dóziszfüggő lehet. **Felhasználhatósági időtartam:** 3 év. **Kiadhatóság:** Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). **A szöveg ellenőrzésének dátuma:** 2021.10.18.

Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását (www.ogyei.gov.hu)! Az aktuális árak a www.neak.gov.hu honlapon megtalálhatóak.

Készítmény megnevezése	Bruttó fogyasztói ár	Normatív támogatási kategória	Normatív támogatás összege	Térítési díj normatív támogatás esetén	KGY keret terhére írható
Benfogamma® 300 mg filmtabletta 30x	5 103 Ft	0%	0 Ft	5 103 Ft	✓

¹ Benfogamma® 300 mg filmtabletta alkalmazási előírás
Bg/H/2022-3 Lezárás dátuma: 2022.08.01.

Medtronic

Szakértő partnere

A szenzoros glükózmonitorozó technológiában



Guardian™ 4 Ujjbegyszúrás nélküli Smart* CGM rendszer

Az előrejelző glükózértéseknek köszönhetően:

- 59%-kal kevesebb hipoglikémiás esemény
- 39%-kal kevesebb hiperglikémiás esemény
- Akár 60 perccel a magas vagy alacsony glükózértékek bekövetkezése előtt

Hamarosan
érkezik



MiniMed™ 740G** Okoseszközökkel kompatibilis inzulinpumpa-rendszer

- Hatékonyabb diabétesz kontroll
 - Preventív technológia az alacsony értékek elkerülésére
 - Az alacsony értékek megelőzésének aránya 80%



MiniMed™ 780G Automata inzulinpumpa-rendszer

- Önszabályozó bázisinzulin adagolás
- Automatikus korrekciós bólus funkcióval***
- Mobiltelefonos alkalmazás a jobb utánkövetésért

* Az intelligens CGM akár 1 órával korábban előrejelzi a jövőbeli magas és alacsony szenzorglükóz-eseményeket, valamint hozzáférést biztosít további algoritmusokhoz és háttér-információkhoz, amelyek tájékoztathatják a felhasználókat a klinikailag releváns vércukormintázatokról. Kérjük, tekintse át a használati útmutatót.

** A MiniMed™ 740G és a MiniMed™ 640G rendszerek ugyanazzal a terápiás algoritmussal rendelkeznek.

*** A funkciót ld. a rendszer felhasználói útmutatóban. A rendszer használata bizonyos mértékű felhasználói interakciót igényel.

Medtronic Hungária Kft.
Dorottya Udvar
1113 Budapest,
Bocskai út 134-146.
C épület, 3.emelet

www.medtronic-diabetes.hu

UC202304383HU



Tartsa szem előtt!

Hyperglycaemia, **GFR**, Adherencia, HbA1c, GFR, Hyperglycaemia, HbA1c, Adherencia, Hyperglycaemia, Adherencia, GFR, HbA1c, Adherencia, HbA1c, Hyperglycaemia, GFR, Hyperglycaemia, **GFR**, Adherencia, HbA1c



A Saxotin (vildagliptin) és a Vilsbox (vildagliptin/metformin) a felnőttek 2-es típusú diabetesének kezelésére javallott.^{1,2}

2022. szeptember 1-től érvényes árak*	Bruttó fogyasztói ár (Ft)	Emelt támogatási összeg (Ft) EÜ70 L.	Térítési díj emelt támogatás esetén (Ft) EÜ70 L.	Közfogyókn kiváltható-e
SAXOTIN 50 mg tabletta, 28x	2 659	1 861	798	Igen
SAXOTIN 50 mg tabletta, 56x	5 200	3 640	1 560	Igen
VILSPOX 50 mg/850 mg filmtabletta, 60x	5 070	3 549	1 521	Igen
VILSPOX 50 mg/1000 mg filmtabletta, 60x	5 070	3 549	1 521	Igen

1. Saxotin alkalmazási előírás, 2020. július 20., www.ogyei.gov.hu

2. Vilsbox alkalmazási előírás, 2020. november 15., www.ogyei.gov.hu

* Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat! Elérési útvonal: <http://www.neak.gov.hu>; szakmának; gyógyszer/gyógyfűrdő; egészségügyi szakembereknek; publikus gyógyszer-törzs; végleges; Publikus gyógyszer-törzs – lakossági tájékoztató.

Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapon. Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve: Saxotin/Vilsbox; Keresés indítása: ikon vagy **Alkalmazási előírás** hiperlink.

Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá. RSdz3443/07.22 · Lezárás dátuma: 2022. 07. 22.

87,8% relatív kockázatcsökkenés a hospitalizáció vagy halálozás tekintetében a placebohoz képest ($P < 0,001$)^{1*}

A PAXLOVID szignifikánsan csökkentette a súlyos COVID-19 irányába történő progresszió kockázatát¹

A PAXLOVID a koronavírus okozta megbetegedés 2019 (COVID-19) kezelésére javallt olyan felnőtt betegnél, akiknél nincs szükség kiegészítő oxigénterápiára, és akiknél fokozott a COVID-19 súlyosság válásának kockázata.²

*EPIC-HR vizsgálati felépítés: A PAXLOVID biztonságosságát és hatáosságát egy nem hospitalizált, tüneteket mutató, laboratórium által igazoltan SARS-CoV-2-fertőzésben szenvedő felnőtt résztvevők körében végzett II/III. fázisú, randomizált, kettős vak, placebokontrollos vizsgálatban, az EPIC-HR (n=2246) vizsgálatban értékelték. Az elsődleges végpont a tünetek jelentkezését követően 3 napon belül terápiában részesültek körében azon résztvevők arányát mérte fel, akiknél a COVID-19-hez kapcsolódó hospitalizációra volt szükség vagy bármilyen okból elhunytak a 28. napig. A másodlagos végpont hasonlóképpen mérte fel az arányt a tünetek jelentkezését követően 5 napon belül terápiában részesültek körében. Ezek az adatok a 2021 decemberéig gyűjtött adatok elsődleges elemzésének eredményeit mutatják be.¹

A leggyakrabban jelentett mellékhatások a II/III. fázisú klinikai vizsgálatban a PAXLOVID vs. placebo csoport esetén:^{1*}

Ízérzés zavara (5,6% vs. 0,3%)

Hasmenés (3,1% vs. 1,6%)

Fejfájás (1,4% vs. 1,3%)

Hányás (1,1% vs. 0,8%)

Hivatkozások: 1. Hammond J, et al. N Engl J Med 2022;386:1397-408. 2. PAXLOVID alkalmazási előírás; https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/paxlovid-epar-product-information_hu.pdf; utolsó megtekintés dátuma: 2022.08.10.

▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

Paxlovid 150 mg + 100 mg filmtabletta

Hatóanyag: 150 mg PF-07321332-t tartalmaz minden rózsaszín filmtabletta*. 100 mg ritonavirt tartalmaz minden fehér színű filmtabletta.* A PF-07321332 a következő kémiai névvel rendelkező anyagnak felel meg: (1R,2S,5S)-N-((1S)-1-ciano-2-((3S)-2-oxopirrolidin-3-il)etil)-3-((2S)-3,3-dimetil-2-(2,2,2-trifluoracetamido)butanoil)-6,6-dimetil-3-azabicyclo[3.1.0]hexán-2-karboxamid.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapokon. OGYÉI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszeradatbázis; Szabadszavas keresés: PAXLOVID, a „KERESÉS INDÍTÁSA”,  vagy **Kísérőiratok** hiperlinkre történő kattintás. Az alkalmazási előírás szövegének ellenőrzési dátuma: 2022. július 1. Kiadhatóság: V; Ár-és támogatási információk: A készítmény jelenleg még nem elérhető Magyarországon.

Bővül a Meforal® család!

ÚJ!



Meforal® XR
METFORMIN HYDROCHLORIDE

Naponta egyszer

1

Napi egyszeri adagolás lehetősége¹



2

Jobb adherencia a kezelés során²



3

Kevesebb lehetséges gastrointestinalis mellékhatás az azonnali hatóanyag-leadású tablettához viszonyítva^{3,4}



https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=165453
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=165451
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=165449

Meforal XR 1000 mg/750 mg/500 mg alkalmazási előírások (2018.10.10): Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! A hatályos "alkalmazási előírások" teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (<https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/>) honlapján. Elérési útvonal: <https://ogyei.gov.hu>; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán  ikonra kattintás, majd az  ikonra kattintás. **Kiadhatóság:** Kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer (V).

Hivatkozások: 1. Alkalmazási előírások: Meforal® XR 1000 mg/750 mg/500 mg retard tabletta (2018.10.27); 2. Donnelly LA, et al. "Adherence in patients transferred from immediate release metformin to a sustained release formulation: a population-based study." Diabetes Obes Metab. 2009; 11(4):338-342. 3. Derosa G, D'Angelo A. "Effects of metformin extended release compared to immediate release formula on glycaemic control and glycaemic variability in patients with type 2 diabetes." Drug Design, Development and Therapy. 2017; 11:1481-1488. 4. Levy J, et al. "Assessment of efficacy and tolerability of once-daily extended release metformin in Patients with type 2 diabetes mellitus." Diabetology & Metabolic Syndrome. 2010; 2:16



**BERLIN-CHEMIE
MENARINI**

Innovációval az életminőség javításáért

Berlin-Chemie/A Menarini Kft
1087 Budapest, Hungária krt. 30/A.
Tel.: +361 799 732

MDT 2022 – BUSZTRANSZFER MENETREND

2022. szeptember 8. (csütörtök)

Szeged Pick Arénától indul	~ 23:00
Ginkgo Hotelhez (Hmvhely) érkezik	~ 23:45

2022. szeptember 9. (péntek)

Ginkgo Hoteltől (Hmvhely) indul	07:15
SZTE TIK-hez érkezik	08:00
Szeged Pick Arénától indul	~ 23:00
Ginkgo Hotelhez (Hmvhely) érkezik	~ 23:45

2022. szeptember 10. (szombat)

Ginkgo Hoteltől (Hmvhely) indul	07:30
SZTE TIK-hez érkezik	08:15
Fehértói Halászcárdához indul a Széchenyi térről a Szeged Étterem előtt	20:00
Fehértói Halászcárdába érkezik	20:20
Fehértói Halászcárdához indul a Forrás Hotel előtt	20:00
Fehértói Halászcárdába érkezik	~ 20:20
Fehértói Halászcárdától indul	~ 23:00
Forrás Hotelhez érkezik érintve a Széchenyi teret	~ 23:20
Fehértói Halászcárdától indul	~ 23:00
Ginkgo Hotelhez (Hmvhely) érkezik	~ 23:30

2022. szeptember 11. (vasárnap)


Ginkgo Hoteltől (Hmvhely) indul	07:15
SZTE TIK-hez érkezik	08:00

SZEGED

Tram, tram-train, trolleybus, bus map

Villamos, vasútvillamos, trolibusz, autóbusz vonalhálózat

Érvényes 2022-től





A MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG TÁMOGATÓI

PLATINA FOKOZATÚ TÁMOGATÓK



GYÉMÁNT FOKOZATÚ TÁMOGATÓK



ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓK



AZ MDT 2022 KONGRESSZUS TOVÁBBI TÁMOGATÓI

A KONGRESSZUS ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓI



RICHTER GEDEON
Richter Gedeon Nyrt.



Sandoz Hungária Kft.

A KONGRESSZUS EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓI



Berlin-Chemie.A/Menarini Kft.



Mölnlycke Health Care Kft.



Teva Gyógyszergyár Zrt.

A KONGRESSZUS BRONZ FOKOZATÚ TÁMOGATÓI



ExtractumPharma Zrt.



Merck Kft.



Zentiva Pharma Kft.

A KONGRESSZUS TOVÁBBI TÁMOGATÓI

Innovelle Pharma Kft.
Synexus Magyarország Kft.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

Füstmentes

JEGYZETEK

[illegible]

JEGYZETEK

[illegible]

JEGYZETEK

[illegible]

A diabéteszes lábfekélyek gyógyulási ideje 50%-kal rövidebb, mint a hagyományos kezelés esetén¹ – Granulox®-szal



**Tudjon meg többet a Granulox®-ról
a www.molnlycke.hu weboldalon
vagy látogasson meg minket
kiállítási standunkon!**

Referenciák: 1. Hunt, SD., Elg, F. A hemoglobin spray (Granulox®) klinikai hatékonysága
adjunktív terápiaként krónikus diabéteszes lábfekélyek kezelésében. 2016. november.

Mölnlycke Health Care Kft. 1134 Budapest, Dévai u. 26-28. A Mölnlycke és Granulox védjegyek, nevek
és logók globálisan be vannak jegyezve egy vagy több Mölnlycke Health Care Group of Companies
számára. © 2021 Mölnlycke Health Care AB. Minden jog fenntartva. HQI/M002731


Mölnlycke®



KEZDJE IDŐBEN a krónikus vesebetegség kezelését!

Közel minden **5.** 3a stádiumú felnőtt
krónikus vesebeteg esetében 2 éven belül
felgyorsul a betegség progressziója⁴



CV HALÁLOZÁS
RIZIKÓJA⁵

STÁDIUM
(eGFR ml/min/1,73m²)

Akár **4,3x** magasabb

3a (eGFR 45-59)

Akár **5,2x** magasabb

3b (eGFR 30-44)

Akár **14x** magasabb

4 (eGFR 15-29)

A FORXIGA® 20 éve az első áttörést jelentő terápia,
amely lassítja a CKD progresszióját a T2D és nem diabéteszes betegeknél¹⁻³

FORXIGA® (dapagliflozin) 5 mg; 10 mg filmtabletta

Bővebb információt olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! A hatályos "alkalmazási előírás" teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapokon. ÖGYEI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu/Adattarsok_nyilvantartasok/Gyogyszer-adattarsok_szabadhasznalasi_keresesben_a_FORXIGA_megadassa_a_KERESESI_INDITASA_BNAikon_vagy_hiperlinkre_torteno_kattintas



Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

Forxiga alkalmazási előírás:

https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=90051

https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=90054

Készítmény megnevezése	Bruttó fogyasztói ár	Támogatás összege	Térítési díj	Emelt támogatási kategória	Indikációs pont
FORXIGA® 5 mg filmtabletta, 30x	12 839 Ft			Társadalombiztosítási támogatással nem rendelkezik.	
FORXIGA® 10 mg filmtabletta, 30x	12 839 Ft	8 967 Ft	3 852 Ft	70%	EU70 1.

A FORXIGA® 10 mg filmtabletta a szív elégtelenség és krónikus vesebetegség indikációjában TB támogatással nem rendelkezik. Kódrólógiai orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V).

Az aktuális árak és támogatási feltételek tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési útvonal: <http://www.neak.gov.hu>; SZAKMÁNAK; GYÓGYSZER/GYÓGYSZERTÁRTÁS; GYÓGYFÜRDŐ TÁMOGATÁSOK;

Egészségügyi szakembereknek; PUBLIKUS GYÓGYSZERTÖRZÉS; VÉGLEGES TÖRZS.

Forrás: 2022. augusztus 1-től érvényes NEAK Publikus Gyógyszerárak.

Rövidítések: T2D = 2. típusú Diabétesz; CKD = krónikus vesebetegség; CV = kardiovaszkuláris; eGFR = számított glomerulus filtrációs ráta.

Referenciák: 1. FORXIGA alkalmazási előírás; 2. Breyer MD et al. Nat Rev Drug Discov. 2016;15(8):588-588; 3. Tuttle KR. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;9(1):3-5; 4. Go AS et al. BMC Nephrol. 2018;19(1):148; 5. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2013;3(1):1-150.

Meilékhatás/Nemkívánatos esemény/Mindösségi panasz bejelentése és orvosszakmai kérdés esetén: +36 1 883 6500 vagy <https://contactazmedical.astrazeneca.com>
HU-9522, Székesfehérvár, 2022. évi 04. 24.

AstraZeneca

AstraZeneca Kft., 1117 Budapest, Alíz utca 4 B ép. 1. em.,
Tel: +36-1-883-6500, www.astrazeneca.hu